

平成 29 年度

## 関西広域連合 准看護師試験問題

### 注 意 事 項

試験開始の指示があるまで、試験問題を開かないでください。

- 1 試験問題は 150 問あります。試験時間は 2 時間 30 分です。
- 2 解答用紙（マークシート）に記入されている受験番号が受験票記載の受験番号と一致しているかを確認し、一致していれば解答用紙に氏名、フリガナを正確に記入してください。
- 3 解答は四肢択一となっています。必ず解答用紙に 1 つだけマークしてください。2 つ以上マークすると、その解答は無効になります。
- 4 記入は HB の黒鉛筆を使用し、解答用紙の記載例（「マークの仕方」の良い例）のとおり、濃くはっきりと記入してください。
- 5 解答用紙に誤ってマークしたときは、消しゴムできれいに消してください。
- 6 解答用紙は、折り曲げたり汚したりしないでください。
- 7 解答用紙は持ち帰らないように、必ず提出してください。
- 8 試験開始から 1 時間は退室できません。1 時間が経過した後に退室する方は、解答用紙の氏名と受験番号を再度確認の上、試験監督者に提出し、静かに退室してください。一度退室すると再入室はできません。
- 9 試験終了前 10 分間は退室できません。
- 10 受験票と試験問題は、持ち帰ってください。

試験会場では静粛にし、試験監督者の指示に従ってください。  
不正行為や試験監督者の指示に従わないときは、退場を命じ、試験を無効とする場合があります。



**問題 1** 筋組織について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 筋組織は収縮能をもつ筋細胞からなる。
- 2 心筋細胞は横紋をもつ。
- 3 平滑筋は血管壁に分布する。
- 4 骨格筋は不随意筋である。

**問題 2** 髄膜と脳脊髄液について、正しい組合せを一つ選べ。

- a 髄膜は3層からなり、一番内側はクモ膜である。
- b 脳脊髄液は脳室内の脈絡叢から分泌される。
- c 脳脊髄液はクモ膜顆粒から静脈に吸収される。
- d 脳脊髄液は1日約100ml分泌される。

1 a、b      2 a、d      3 b、c      4 c、d

**問題 3** 血液について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 赤血球のヘモグロビンは、肺で取り入れた酸素を末梢組織に運ぶ。
- 2 B細胞（Bリンパ球）は、胸腺での成熟過程を経て末梢血に放出される。
- 3 単球は、血管外に出るとマクロファージとなる。
- 4 血小板は血液凝固に大切な役割を果たす。

**問題 4** 次のうち、正しいものを一つ選べ。

- 1 右心室から肺静脈が出る。
- 2 心臓の下端部を心尖、上端の広い部分を心底部という。
- 3 心電図のQRS波は、心房筋の興奮を表している。
- 4 心拍数が正常より多いものを不整脈という。

**問題 5** 次のうち、誤っているものを一つ選べ。

- 1 胃腺の主細胞は、トリプシンを分泌する。
- 2 胃の出口の開閉は、幽門括約筋が行う。
- 3 膵臓にはランゲルハンス島が散在する。
- 4 ファーター乳頭は総胆管と膵管の開口部にある。

**問題 6** 肝臓で産生されるものについて、誤っているものを一つ選べ。

- 1 アルブミン
- 2 エリスロポエチン (エリスロポイチン)
- 3 尿素
- 4 フィブリノゲン (線維素原)

**問題 7** 血糖を下げる作用のホルモンについて、正しいものを一つ選べ。

- 1 インスリン
- 2 プロラクチン
- 3 グルカゴン
- 4 糖質コルチコイド (コルチゾール)

**問題 8** 尿の生成について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 一側の腎臓には約 100 万個のネフロンが存在する。
- 2 成人男性の 1 日の糸球体濾過量は約 100 である。
- 3 原尿に含まれる糖は、尿細管でほぼ 100%再吸収される。
- 4 成人男性の 1 日の尿量は約 1~1.50 である。

**問題 9** タンパク質を合成するものについて、正しいものを一つ選べ。

- 1 核
- 2 ゴルジ装置
- 3 ミトコンドリア
- 4 リボソーム

**問題 10** 栄養素について、正しいものを一つ選べ。

- 1 三大栄養素はタンパク質、ミネラル及び糖質である。
- 2 果糖は単糖類である。
- 3 リンは赤血球のヘモグロビンの成分である。
- 4 飽和脂肪酸は血中コレステロールを低下させる。

**問題 11** 疾患と食事療法の組合せで、誤っているものを一つ選べ。

- |   |         |   |           |
|---|---------|---|-----------|
| 1 | 急性腎不全   | — | タンパク質の制限  |
| 2 | 高尿酸血症   | — | エネルギー量の制限 |
| 3 | 胃潰瘍     | — | 香辛料の制限    |
| 4 | うっ血性心不全 | — | 食物繊維の制限   |

**問題 12** タンパク質について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 胃内で分解される。
- 2 分子中に炭素、水素、酸素及び窒素を含む。
- 3 アミノ酸が結合してできている。
- 4 成人男性の必要量は、1日約 30 g である。

**問題 13** 次のうち、正しいものを一つ選べ。

- 1 毒薬は白地に赤枠、赤字で「毒」と品名が表記されている。
- 2 麻薬は鍵をかけた麻薬保管庫に保管する。
- 3 看護師は麻薬管理者免許を受ける資格をもつ。
- 4 マリファナは麻薬である。

**問題 14** 治療薬と疾患の組合せで、正しいものを一つ選べ。

- 1 バンコマイシン — B型肝炎
- 2 リファンピシン — 結核
- 3 オセルタミビル (タミフル®) — マイコプラズマ肺炎
- 4 エリスロマイシン (エリスロシン®) — インフルエンザ

**問題 15** 薬物作用について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 複数の薬物の効果が合わさった以上に働くことを拮抗作用という。
- 2 催眠薬は、飲酒と併用すると作用が増強される。
- 3 モルヒネは身体的依存をおこす。
- 4 腎臓と肝臓は薬物の排泄に大きな役割をもつ。

**問題 16** 病理診断について、正しいものを一つ選べ。

- 1 生検で得られた組織は、速やかに十分な量の固定液中に保存する。
- 2 細胞診は検診で用いられることはない。
- 3 迅速診断で作成される標本は、通常の標本と同じ品質である。
- 4 細胞診で悪性が疑われた場合は、組織診断をあらためて行う必要はない。

**問題 17** 変性によって引き起こされる疾患について、正しいものを一つ選べ。

- 1 心筋梗塞
- 2 肺炎
- 3 結石
- 4 前立腺肥大症

**問題 18** 悪性腫瘍について、正しいものを一つ選べ。

- 1 非上皮性悪性腫瘍をがん腫という。
- 2 低分化とは、発生したもとの組織と類似しているものをさす。
- 3 腫瘍の転移には、血行性、リンパ行性及び播種性がある。
- 4 ヒトT細胞白血病ウイルス1型は慢性骨髄性白血病の原因となる。

**問題 19** 心疾患について、正しいものを一つ選べ。

- 1 左冠状動脈回旋枝が閉塞すると左心室前壁の心筋梗塞となる。
- 2 感染性心内膜炎の原因菌として黄色ブドウ球菌やレンサ球菌があげられる。
- 3 心筋症は突然死の原因とならない。
- 4 ファロー四徴症は、肺静脈狭窄、心室中隔欠損、大動脈騎乗<sup>きじょう</sup>及び左心室肥大よりなる。

**問題 20** 肝硬変の症状について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 動悸
- 2 腹水
- 3 肝性脳症
- 4 女性化乳房

**問題 21** 腎疾患について、正しいものを一つ選べ。

- 1 腎細胞がんのうち最も多いのは扁平上皮がんである。
- 2 腎細胞がんは血行性転移をきたしやすい。
- 3 腎盂腎炎の原因としてブドウ球菌が多い。
- 4 糖尿病は糸球体腎炎の原因にならない。

**問題 22** 次の組合せで、正しいものを一つ選べ。

- |   |             |   |         |
|---|-------------|---|---------|
| 1 | E Bウイルス     | — | DNAウイルス |
| 2 | B型肝炎ウイルス    | — | RNAウイルス |
| 3 | インフルエンザウイルス | — | 空気感染    |
| 4 | 麻疹ウイルス      | — | 経口感染    |

**問題 23** 大腸菌について、正しいものを一つ選べ。

- 1 グラム陽性桿菌である。
- 2 胃から大腸に常在している。
- 3 腸管出血性大腸菌はベロ毒素を産生する。
- 4 腸管出血性大腸菌感染症は2類感染症に分類される。

**問題 24** ワクチンについて、正しいものを一つ選べ。

- 1 生ワクチンは不活化ワクチンに比べ、持続時間が短い。
- 2 ロタウイルスに対するワクチンはない。
- 3 麻疹ワクチンは生ワクチンである。
- 4 風疹ワクチンは不活化ワクチンである。

**問題 25** 臓器移植について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 臓器提供者をドナーという。
- 2 臓器の移植を受ける者をレシピエントという。
- 3 本人の臓器提供の意思が不明な場合、家族の承諾があれば臓器を提供できる。
- 4 臓器提供が可能な年齢は15歳以上である。

**問題 26** 看護の倫理について、正しいものを一つ選べ。

- 1 ICNによる看護師の基本的責務は、健康の増進、疾病の予防、疾病の治療及び健康の回復である。
- 2 ヘルシンキ宣言ではリビングウィルについて提唱された。
- 3 看護者の倫理綱領（日本看護協会、2003年）には、患者の権利擁護について書かれている。
- 4 「ナイチンゲール誓詞」はナイチンゲールが作成した。

**問題 27** ストレスについて、誤っているものを一つ選べ。

- 1 内・外的環境の変化に対し自分の欲求を調整し、環境の変化を促しながら支障なく生活できることを適応している状態という。
- 2 ストレスに対し何らかの対処行動をとることを、コンプライアンスという。
- 3 警告反応期はショック症状の後、ショックに対する防御（防衛）反応がおこる。
- 4 抵抗期は、ストレスに対する抵抗力が増す。

**問題 28** カウンセリング的に関わる看護者の態度について、正しいものを一つ選べ。

- 1 誘導
- 2 同情
- 3 価値判断
- 4 自己一致

**問題 29** 入院による心理的特徴について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 乳幼児では、母親と離れることで分離不安を生じやすい。
- 2 思春期では、親や看護者に悩んだり苦しんだりしている姿を見せたくないという気持ちをもつ。
- 3 成人後期では、社会的に安定していることから不安は大きくない。
- 4 老年期では、生命の限界を意識し死への不安が増強される。

**問題 30** 次の組合せで、正しいものを一つ選べ。

- |   |           |   |                 |
|---|-----------|---|-----------------|
| 1 | 作業環境管理    | — | 労働基準法           |
| 2 | 児童の定期健康診断 | — | 医療法             |
| 3 | 要介護認定     | — | 高齢者の医療の確保に関する法律 |
| 4 | 受動喫煙の防止   | — | 健康増進法           |

**問題 31** 次のうち、正しいものを一つ選べ。

- 1 後期高齢者医療制度の保険者は市町村である。
- 2 介護認定審査会は都道府県に設置されている。
- 3 ノーマライゼーションとは、障害があっても健常者と区別されることなく社会生活を共にするという考え方である。
- 4 トータルヘルスプロモーションは、すべての人の心とからだの健康づくり対策である。

**問題 32** 保健師助産師看護師法について、正しいものを一つ選べ。

- 1 准看護師制度は、1948（昭和 23）年に設けられた。
- 2 免許を有する場合も、相対的欠格事由の規定は適用される。
- 3 免許の取り消し処分を受けた場合は、再び免許を与えられることはない。
- 4 准看護師になるには、厚生労働大臣の行う試験に合格しなければならない。

**問題 33** 看護師等の人材確保の促進に関する法律について、正しいものを一つ選べ。

- 1 行政処分を受けた看護師等の再教育制度について規定されている。
- 2 看護師等の人材確保促進のための基本方針を策定するのは都道府県知事である。
- 3 看護師等就業協力員は、看護師等の確保のための施策及び看護に対する住民の理解を深める活動を行う。
- 4 就職していない又は離職した看護師等は、都道府県ナースセンターに必ず届け出なければならない。

**問題 34** 看護理論家について、正しいものを一つ選べ。

- 1 アブデラは「臨床看護の本質」を著した。
- 2 ペプロウは、看護とは生命力の消耗を最小にするよう生活過程を整えることとした。
- 3 オレムは、看護とは対人関係のプロセスであるとした。
- 4 ロイは、人間は4つの様式によって環境に適応して生活する存在であるとした。

**問題 35** 健康の概念について、正しいものを一つ選べ。

- 1 オタワ憲章ではプライマリヘルスケアの考え方を提唱した。
- 2 QOLには生命の質、人生の質及び心理の質という3つの側面が含まれている。
- 3 アルマ・アタ宣言ではヘルスプロモーションの考え方を提唱した。
- 4 日本国憲法第25条には、健康は国民に与えられた権利であると明記されている。

**問題 36** 疾病の3次予防について、正しいものを一つ選べ。

- 1 リハビリテーション
- 2 早期発見
- 3 早期治療
- 4 発病予防

**問題 37** 人間の成長発達について、正しいものを一つ選べ。

- 1 成長発達の過程は、器官によって大まかに5つの発育型に分類できる。
- 2 スキャモンの発育型では、神経型は早い時期の発達が著しい。
- 3 個々の組織は常に同じ速さで発達する。
- 4 成長発達は環境の影響を受けない。

**問題 38** 看護者の対応について、正しいものを一つ選べ。

- 1 自分の力量を超える看護行為であっても責任を果たすために引き受ける。
- 2 医師がインフォームドコンセントを行う際は、患者が理解できるように支援する。
- 3 治療に拒否的な患者には、同意するようすすめる。
- 4 患者からの質問には、専門用語を用いて説明する。

**問題 39** バイタルサイン測定について、正しいものを一つ選べ。

- 1 ジャパンコーマスケールを使うときは、痛み刺激は行わない。
- 2 経皮的動脈血酸素飽和度は、パルスオキシメーターで測定する。
- 3 脈拍測定は、橈骨動脈の上に母指を添えて測定する。
- 4 直腸検温は成人の場合、1.5～2 cm挿入する。

**問題 40** スタンダードプリコーションについて、誤っているものを一つ選べ。

- 1 感染対策の基準として普及しているガイドラインである。
- 2 感染症の有無にかかわらず、すべての患者に必要とされる。
- 3 汗を含むすべての湿性生体物質は、感染性の病原体を含む可能性がある。
- 4 交差感染を防ぐ。

**問題 41** 患者とのコミュニケーションについて、誤っているものを一つ選べ。

- 1 患者の言葉に耳を傾けることで、看護師が患者に関心をもっていることを伝えることができる。
- 2 患者と話すときは適切な空間距離をとる。
- 3 話がまとまらない場合は、内容を要約して確認する。
- 4 アイコンタクトでメッセージを送ることはできない。

**問題 42** 看護過程について、正しいものを一つ選べ。

- 1 問題解決アプローチでは、患者の個別性は考慮されない。
- 2 看護診断にはNANDA国際ナショナルによる定義と分類を参考にすることができる。
- 3 看護計画における目標には期限を設けない。
- 4 評価は患者の退院が決定したときのみ行う。

**問題 43** POS（問題指向型システム）の記録について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 経過記録をSOAPに従って記録する。
- 2 S（subjective data）は患者の訴えなどの主観的データである。
- 3 O（objective data）は測定値など観察で得られた客観的データである。
- 4 A（assessment）は看護計画の立案である。

**問題 44** 患者誤認防止について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 意識の清明な患者には、本人に氏名を名乗ってもらう。
- 2 意識障害のある患者は、ベッドの名札で確認する。
- 3 入院患者にネームバンド（患者識別バンド）をつけてもらう。
- 4 外来では、呼び出した後に対面で氏名を確認する。

**問題 45** 身体抑制について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 抑制は、一時的なものとし必要最小限の時間にとどめる。
- 2 抑制帯、拘束衣及びミトンなどは拘束用具である。
- 3 患者が自分で降りることができないようにベッド柵（サイドレール）で囲むのは、抑制にはならない。
- 4 抑制帯を使用する際は、血行障害や摩擦による損傷を観察する。

**問題 46** 腹囲測定について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 目的の一つにメタボリックシンドロームの診断（判定）がある。
- 2 仰臥位の場合、身体を軸として臍の位置で垂直となるように測定する。
- 3 最大腹囲の経過観察を行う場合、臍からの測定距離を決めておく。
- 4 目盛は吸気の終わりに読む。

**問題 47** 臥床患者のシーツ交換について、正しいものを一つ選べ。

- 1 患者の掛物を全部外してから、シーツ交換を始める。
- 2 使用していた敷シーツは、外側に折りたたみながらまとめる。
- 3 粘着ローラーによるベッド上の清掃は、頭側から足もと側に向かって行う。
- 4 取り除いたシーツは床に置く。

**問題 48** 食事の援助について、正しいものを一つ選べ。

- 1 病院食は治療食と検査食の2種類に分けられる。
- 2 座位やファーラー位の場合、患者の頸部は前屈した体位にする。
- 3 食事動作が不自由な場合は看護者が全面的に介助する。
- 4 自助具は看護者が使用しやすいものを選ぶ。

**問題 49** 排泄の援助について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 生活環境や生活リズムが変化すると、排泄習慣は容易に乱れる。
- 2 尿や便失禁のある患者には、おむつを積極的にすすめる。
- 3 プライバシーを守るためカーテンやスクリーンをする。
- 4 女性の場合は、排便時に排尿があることを考慮し、尿の飛沫防止を行う。

**問題 50** 入浴について、正しいものを一つ選べ。

- 1 食直後は消化管に血流を集中させるため、入浴は避ける。
- 2 湯の温度は 35～37℃とする。
- 3 バイタルサインのチェックは入浴後のみ行う。
- 4 入浴後の飲水は口渇の訴えがなければ促さない。

**問題 51** 体位変換について、正しいものを一つ選べ。

- 1 看護者は支持基底面を狭くした姿勢で行う。
- 2 仰臥位から側臥位にするには患者の両膝を伸ばし、膝と腰部を回転させて行う。
- 3 長座位から端座位へは患者の殿部を軸にして回転させる。
- 4 体位変換は全て一人で行い、他の看護者の協力は求めない。

**問題 52** 褥瘡について、正しいものを一つ選べ。

- 1 身体の活動性が高くなると褥瘡が発生しやすくなる。
- 2 麻痺は褥瘡の発生要因ではない。
- 3 仰臥位の場合、肩峰突起部は好発部位である。
- 4 ブレーデンスケールは褥瘡発生予測スケールの一つである。

**問題 53** 診察の介助について、正しいものを一つ選べ。

- 1 胸部の診察時には、患者のプライバシーを守るため看護師は退室する。
- 2 腹部の診察はファーラー位をとるように介助する。
- 3 診察に必要な部位のみを露出する。
- 4 診察に使用した物品は全て滅菌する。

**問題 54** 経管栄養法について、正しいものを一つ選べ。

- 1 経口から十分な食事を摂ることができない患者に行われる。
- 2 体位は仰臥位とする。
- 3 流動物を注入する前に、チューブの先端が食道部にあることを確認する。
- 4 流動物の注入後は5～10mlの白湯やお茶でチューブ内を洗浄する。

**問題 55** 一時的導尿の援助について、正しいものを一つ選べ。

- 1 尿閉に対する処置として行う。
- 2 消毒されたカテーテルを使用する。
- 3 成人の場合、ネラトンカテーテルは5～8Frを使用する。
- 4 成人男性の場合はカテーテルを10 cm挿入する。

**問題 56** 睡眠について、正しいものを一つ選べ。

- 1 サーカディアンリズムは生活習慣の影響を受けない。
- 2 病院の環境は睡眠を妨げる因子にはならない。
- 3 体温は入眠とともに低下し、覚醒する頃に上昇する。
- 4 レム睡眠は浅い睡眠から深い睡眠まで、4つの段階に分けられている。

**問題 57** 成人に対する浣腸の援助について、正しいものを一つ選べ。

- 1 催下浣腸は大腸内の便の排泄を促す目的で行う。
- 2 グリセリン浣腸は60%溶液を用いる。
- 3 催下浣腸液の温度は35℃とする。
- 4 カテーテル挿入の長さは10cmとする。

**問題 58** 湿性温罨法について、正しいものを一つ選べ。

- 1 温湿布
- 2 湯たんぽ
- 3 熱気浴
- 4 電気あんか

**問題 59** ネブライザーによる薬液噴霧について、正しいものを一つ選べ。

- 1 超音波ネブライザーは、咽頭から喉頭まで薬液が到達する。
- 2 体位は、座位または半座位、側臥位とする。
- 3 吸入中は呼吸回数を多くし、薬液の吸入を促進する。
- 4 呼吸状態や喀痰の有無の観察は、吸入1時間後から開始する。

**問題 60** 肘・膝関節に用いる包帯の巻き方について、正しいものを一つ選べ。

- 1 らせん帯
- 2 かんこうたい  
環行帯
- 3 せつてんたい  
折転帯
- 4 きっこうたい  
亀甲帯

**問題 61** 与薬について、正しいものを一つ選べ。

- 1 与薬の確認は、3つのRで行う。
- 2 薬剤の確認は、最低3回行う。
- 3 与薬するすべての患者の薬剤を一つのトレイに準備する。
- 4 食間薬は、食後1時間程度経過した後に服用するよう説明する。

**問題 62** 坐薬の挿入について、正しいものを一つ選べ。

- 1 坐薬は、肛門括約筋の内側まで挿入する。
- 2 坐薬は、潤滑油をつけないで挿入する。
- 3 挿入時は、口を閉じて腹部に力を入れるように伝える。
- 4 挿入後、すぐに排便を促す。

**問題 63** 点眼について、正しいものを一つ選べ。

- 1 体位は、座位または仰臥位とする。
- 2 点眼時には、まっすぐ前を見るように説明する。
- 3 点眼後は、3～4回のまばたきを促す。
- 4 点眼後は、目じりを軽く押さえる。

**問題 64** 皮下注射について、正しいものを一つ選べ。

- 1 刺入部の皮膚を伸展させる。
- 2 皮膚面に対して45～60度の角度で注射針を刺入する。
- 3 注射針の刺入はゆっくり行う。
- 4 刺入部から末梢にかけて、しびれ感が生じた場合は直ちに針を抜く。

**問題 65** 真空採血管による採血について、正しいものを一つ選べ。

- 1 採血ホルダーと採血針と採血管を接続し、静脈穿刺する。
- 2 抗凝固薬が入っている採血管は、上下によく振って混和する。
- 3 採血終了後は駆血帯を外したあと、採血管をホルダーから外す。
- 4 採血針とホルダーは専用廃棄容器に捨てる。

**問題 66** 腰椎穿刺について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 腰椎間からクモ膜下腔に穿刺する。
- 2 ヤコビー線と背柱の交点を目安として穿刺する。
- 3 穿刺後は頭部を挙上した安楽な体位にする。
- 4 穿刺後 24 時間は安静とする。

**問題 67** 慢性疾患の特徴について、正しいものを一つ選べ。

- 1 病状がコントロールされ、病状や症状が落ち着いている時期を寛解期という。
- 2 急激に発症することが多いが、早期に治療すれば完治する。
- 3 がんは、どのような病状でも慢性疾患には含まれない。
- 4 喫煙は慢性疾患の発症に関与しない。

**問題 68** 全身麻酔中の合併症について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 気道閉塞（気道狭窄）
- 2 呼吸促進
- 3 低酸素血症
- 4 不整脈

**問題 69** 薬物療法について、正しいものを一つ選べ。

- 1 薬物の代謝は肝臓で行われ、他の臓器は関与しない。
- 2 薬物は吸収、分布、代謝及び排泄という経路をたどる。
- 3 薬物は飲食物との相互作用で、作用が増強または減弱することはない。
- 4 副作用の出現に年齢は影響しない。

**問題 70** 輸液療法を受ける患者の看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 浸透圧の高い輸液剤は、末梢静脈から投与する。
- 2 発疹などのアレルギー症状に注意する。
- 3 点滴の滴下速度は体動により変化することはない。
- 4 輸液ラインやカテーテルの長さは、動きを妨げないようにできるだけ短くする。

**問題 71** 呼吸困難のある患者の看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 食後は胃が膨らみ横隔膜が下がり、呼吸しやすくなる。
- 2 ヒュージョーンズの分類のV度では、会話や衣類の着脱時も息切れが起こる。
- 3 症状が増強しない呼吸法は胸式呼吸である。
- 4 不安があると呼吸が抑制され、ゆっくりした呼吸になる。

**問題 72** 放射線の特徴と放射線治療について、正しいものを一つ選べ。

- 1 放射線防護の3原則は、時間、遮蔽及び洗浄である。
- 2 遠隔照射は、1回の照射量を多くし回数を減らす。
- 3 放射線治療は、すべて小線源療法で行われる。
- 4 放射線治療により、白血球減少や血小板減少が出現することがある。

**問題 73** 発熱のある患者の看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 発熱時は代謝が低下する。
- 2 悪寒が強い場合は、冷罨法を行い体温を下げる。
- 3 発汗の多いときは、水分や電解質の補給を促す。
- 4 舌や口腔粘膜の乾燥を防ぐために、歯磨きや含嗽<sup>がんそう</sup>を中止する。

**問題 74** 痛みのある患者の看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 グラスゴーコーマスケールは痛みの尺度である。
- 2 痛みがあると筋肉は弛緩し、筋肉が弛緩すると痛みはさらに増強する。
- 3 炎症を伴う急性の痛みには温罨法を行い、積極的に温める。
- 4 がん性疼痛には、主にモルヒネなどの麻薬を使用する。

**問題 75** 終末期について、正しいものを一つ選べ。

- 1 1977年以降、病院などの施設より自宅で死亡する人が多くなった。
- 2 死の判定は、呼吸停止と心停止により判定される。
- 3 トータルペインとは、身体的・精神的・心理的・霊的苦痛が相互に関係する。
- 4 家族のケアでは予期的悲嘆への関わりが重要である。

**問題 76** 黄疸のある患者の看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 黄疸とは血中にアンモニアが増加した状態である。
- 2 安静臥床にすると肝臓への血流が減少する。
- 3 出血しやすいので、歯ブラシは柔らかいものを使用する。
- 4 掻痒感を予防するため、寝具や寝衣は化学繊維の製品を使用する。

**問題 77** 次のうち、正しい組合せを一つ選べ。

- a 壮年期は身体的・心理的・社会的にも安定した時期である。
- b 青年期は、自我同一性（アイデンティティ）の確立の時期にある。
- c 壮年期の身体的な衰えは一様である。
- d 定年を迎える時期は精神的に最も安定している。

1 a、b      2 a、d      3 b、c      4 c、d

**問題 78** 回復期・リハビリテーション期の看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 回復期とは、急性期を脱し治癒に向かう時期をいう。
- 2 意識がない状態を脱したら、すぐにリハビリテーションを開始する。
- 3 リハビリテーションとは、リハビリテーション室で行う訓練をいう。
- 4 看護者の役割は、患者を常に励ますことである。

**問題 79** 呼吸器疾患について、正しいものを一つ選べ。

- 1 自然気胸は女性に多い疾患である。
- 2 慢性閉塞性肺疾患では薬物療法より外科療法が優先される。
- 3 肺がんの患者には直接服薬確認療法の体制が強化されている。
- 4 咳嗽、痰、発熱、全身倦怠感など、感冒様症状が2週間以上続く場合は肺結核を疑う。

**問題 80** 肺炎とその看護について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 市中肺炎は、感冒などのウイルス感染に続発することが多い。
- 2 院内肺炎予防では、医療従事者の手洗いの励行が重要である。
- 3 食事は低カロリー食とする。
- 4 水分は十分に補給する。

**問題 81** 肺がんとその看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 原発性肺がんは壮年期に多く発症する。
- 2 肺切除術後は上肢の安静を保つ。
- 3 大量の胸水がある場合は、胸腔ドレナージにより一度に排液する。
- 4 終末期は、がん性疼痛と呼吸困難による苦痛の緩和に努める。

**問題 82** 消化器の検査とその看護について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 超音波検査（エコー）は、肝臓、胆のうの病変及び胆石の診断に有用な検査である。
- 2 上部消化管内視鏡検査前日の緩下剤は不要である。
- 3 下部消化管内視鏡検査では、前日の朝から禁飲食とする。
- 4 消化管造影検査後には、白い便が出ることを説明し水分摂取を促す。

**問題 83** 胃切除術を受ける患者の看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 術後に胃チューブを留置するのは、吻合部の減圧のためである。
- 2 深部静脈血栓予防のため、術後歩行可能になったら弾性ストッキングを着用する。
- 3 胃切除後の貧血は、手術時の出血によるものである。
- 4 術後に黄疸がみられたらダンピング症候群を疑う。

**問題 84** 胆石症とその看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 胆石の検査では、腹部単純X線検査が最も多く行われる。
- 2 胆石の嵌頓に細菌感染を合併して発症するのは、急性胆のう炎、胆管炎である。
- 3 根治的な治療法は、胆のう内の胆石を取り除く手術である。
- 4 ドレナージチューブに接続した排液バックは、挿入部より上方に位置させる。

**問題 85** 消化器疾患患者の看護について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 急性膵炎では、状態が安定するまでは絶食とする。
- 2 虫垂炎の腹痛では、初期よりブルンベルグ徴候がみられる。
- 3 クロウン病では、栄養障害に対する栄養管理が重要である。
- 4 食道がんの手術では、手術侵襲が大きく肺合併症を起こしやすい。

**問題 86** 消化器症状について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 腹痛はその機序から内臓痛、体性痛及び関連痛に分類される。
- 2 がん性腹膜炎の腹水は<sup>しんしゅつえき</sup>滲出液である。
- 3 胸やけとは、心窩部から胸骨後面にかけて焼けるような感じをいう。
- 4 鼓腸とは、消化管内に大量の水が貯留した状態をいう。

**問題 87** 循環器疾患について、正しいものを一つ選べ。

- 1 労作狭心症は異型狭心症とも呼ばれる。
- 2 心機能の重症度評価にNYHAの心機能分類が広く用いられる。
- 3 左心不全の徴候として浮腫は重要である。
- 4 チアノーゼは還元ヘモグロビンが2g/dl以下になると出現する。

**問題 88** 白血病について、正しい組合せを一つ選べ。

- a 急性白血病の治療には、分子標的治療薬イマチニブが投与される。
- b 急性白血病の症状は、発熱、出血傾向及び貧血である。
- c 診断は骨髓検査と血液検査で行う。
- d 慢性骨髄性白血病は、播種性血管内凝固症候群（DIC）を合併する。

- 1 a、b      2 a、d      3 b、c      4 c、d

**問題 89** 血液・造血器疾患とその看護について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 骨髄抑制は、化学療法後 2 週間頃にピークとなる。
- 2 貧血のときは、新陳代謝を上げるために運動をすすめる。
- 3 白血球数  $1000/\mu\text{l}$  以下が続くときは、感染予防のため面会を制限する。
- 4 出血傾向がある場合、皮膚では点状、斑状出血を認める。

**問題 90** 骨髄穿刺について、正しいものを一つ選べ。

- 1 肋骨を穿刺して骨髄液を吸引する。
- 2 骨髄穿刺は全身麻酔で行う。
- 3 穿刺終了後は、穿刺部を圧迫固定するので臥床安静の必要はない。
- 4 穿刺当日の入浴やシャワーは禁止する。

**問題 91** 次の組合せで、誤っているものを一つ選べ。

- |   |         |   |            |
|---|---------|---|------------|
| 1 | 再生不良性貧血 | — | 汎血球増加      |
| 2 | 悪性リンパ腫  | — | リンパ節腫大（腫脹） |
| 3 | 多発性骨髄腫  | — | 病的骨折       |
| 4 | 造血幹細胞移植 | — | 移植片対宿主病    |

**問題 92** 糖尿病について、正しいものを一つ選べ。

- 1 糖尿病は、成因から 1 型と 2 型に分類される。
- 2 Hb A1c は過去 1~2 週間の平均血糖値である。
- 3 インシュリン注射に適した部位は前腕である。
- 4 糖尿病の三大合併症とは、網膜症・腎症・神経障害である。

**問題 93** バセドウ病について、正しいものを一つ選べ。

- 1 体重は増加傾向になる。
- 2 20～30歳の男性に多い。
- 3 主な症状は、甲状腺腫、頻脈、眼球突出がある。
- 4 治療は甲状腺ホルモンの補充を行う。

**問題 94** 虚血性心疾患について、正しいものを一つ選べ。

- 1 高血圧、脂質異常、糖尿病及び喫煙は、動脈硬化をきたす因子である。
- 2 労作時狭心症は、通常夜間あるいは早朝安静時に起こる。
- 3 狭心症の胸痛発作にはニトログリセリンの投与は効果がない。
- 4 心筋梗塞の特徴的な所見は、心電図上STの下降である。

**問題 95** 筋萎縮性側索硬化症について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 構音障害、嚥下障害などの球麻痺症状が出現する。
- 2 進行性の筋力低下と筋萎縮が特徴である。
- 3 感覚障害は早期から出現する。
- 4 進行をとめる根本的な治療法はない。

**問題 96** クモ膜下出血について、正しいものを一つ選べ。

- 1 突然の激しい頭痛が出現する。
- 2 片麻痺などの局所脳症状を伴う。
- 3 意識障害は出現しない。
- 4 項部硬直は発症後30分以内に出現する。

**問題 97** ハンギングキャスト療法を受ける患者の看護について、正しい組合せを一つ選べ。

- a 後頸部の皮膚障害の有無を確認する。
- b 就寝時も座位か半座位を保つ体位とする。
- c 首からつるすひもの長さは、患者自身で調節するよう説明する。
- d 患者のADLを全面的に援助する。

1 a、b      2 a、d      3 b、c      4 c、d

**問題 98** 変形性膝関節症患者の看護について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 体重をコントロールするように説明する。
- 2 関節内注入時は、無菌操作を厳守する。
- 3 高位脛骨骨切術後は、坐骨神経麻痺の観察を行う。
- 4 人工関節置換術後は、筋力強化訓練を行う。

**問題 99** 脊髄損傷患者の看護について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 急性期の体位変換は禁忌である。
- 2 褥瘡予防のために皮膚の観察と清潔の保持を行う。
- 3 自己導尿の必要性和方法を説明する。
- 4 残存機能を最大限活用するため関節の拘縮を予防する。

**問題 100** 成人のネフローゼ症候群の診断基準について、正しい組合せを一つ選べ。

- a 1日の尿タンパク排出量が3.5g以上持続する。
- b 血清アルブミン値は6.0g/dl以下である。
- c 血清総タンパク量は3.0g/dl以下である。
- d 血漿膠質浸透圧の低下により浮腫をきたす。

1 a、b      2 a、d      3 b、c      4 c、d

**問題 101** 腎・泌尿器疾患の治療について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 膀胱全摘出術のときは尿路変向術が行われる。
- 2 筋層非浸潤性膀胱がんの術後、再発予防のためBCGや抗がん薬を膀胱内に注入する。
- 3 がんの大きさに関わらず、腎がんは腎摘出術が行われる。
- 4 尿管結石には、体外衝撃波結石破砕術（体外衝撃波碎石術）や経尿道的尿管碎石術が行われる。

**問題 102** 子宮頸がんについて、誤っているものを一つ選べ。

- 1 ヒトパピローマウイルス感染の予防に、ワクチン接種は無効である。
- 2 子宮頸部の細胞診はスクリーニングとして有効である。
- 3 初期症状として不正性器出血と帯下の増量がある。
- 4 進行がんには、放射線療法に化学療法が併用して行われる。

**問題 103** 疾患と治療の組合せで、誤っているものを一つ選べ。

- |   |          |   |           |
|---|----------|---|-----------|
| 1 | 外陰炎      | — | 抗菌薬の局所療法  |
| 2 | バルトリン腺膿瘍 | — | 切開排膿      |
| 3 | 萎縮性膣炎    | — | プロゲステロン補充 |
| 4 | 子宮筋腫     | — | ホルモン療法    |

**問題 104** 膣タンポン挿入時の看護について、正しい組合せを一つ選べ。

- a 膣洗浄後に使用する。
- b 止血や薬物の流出を防止する目的で使用する。
- c 複数の挿入は禁忌である。
- d 不快になったら、いつでも抜去してよいことを説明する。

- 1 a、b      2 a、d      3 b、c      4 c、d

**問題 105** 乳がんの術後患者の看護について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 持続的にドレナージをする場合は、低圧持続吸引バッグ(装置)に接続する。
- 2 患側上肢の下に枕を入れて挙上する。
- 3 ボディイメージの変化に対し、患者がどのように受け止めているかを知る。
- 4 自己検診は手術した乳房のみを行うよう指導する。

**問題 106** 次の組合せで、正しいものを一つ選べ。

- |   |            |   |            |
|---|------------|---|------------|
| 1 | 接触性皮膚炎     | — | パッチテスト     |
| 2 | 脂漏性皮膚炎(湿疹) | — | 高齢者に多い     |
| 3 | 伝染性膿痂疹     | — | 冬季に多い      |
| 4 | 白癬         | — | 副腎皮質ステロイド薬 |

**問題 107** 熱傷について、正しいものを一つ選べ。

- 1 水疱形成が認められると、熱傷の深さはⅢ度と判定される。
- 2 受傷面積の算出には、成人では5の法則が用いられる。
- 3 成人では受傷面積が40%以上になると生命の危険がある。
- 4 I度の熱傷では、外科的植皮術を行う。

**問題 108** 白内障患者の看護について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 手術当日は入浴できないことを説明する。
- 2 手術前から点眼指導を行う。
- 3 手術後の床上安静は必要としない。
- 4 手術後は片眼帯となることを説明する。

**問題 109** 喉頭がんについて、正しい組合せを一つ選べ。

- a 治療には手術療法、放射線療法及び化学療法がある。
- b 女性に多い。
- c 主な症状は喘鳴である。
- d 喉頭全摘術後は、人工喉頭発声法や食道発声法の習得が必要となる。

1 a、b      2 a、d      3 b、c      4 c、d

**問題 110** 歯科疾患について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 乳歯は20本、永久歯は28～32本である。
- 2 う蝕症は、歯の疾患の中で最も多い。
- 3 処置時の痛みを除くために全身麻酔法が多用される。
- 4 口腔内の症状は全身疾患と関連していることがある。

**問題 111** アレルギー・膠原病疾患の組合せで、正しいものを一つ選べ。

- 1 I型アレルギー      —      細胞傷害型
- 2 膠原病                —      自己免疫疾患
- 3 関節リウマチ        —      対称性の筋力低下
- 4 IV型アレルギー     —      免疫複合型

**問題 112** 性感染症について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 性感染症とは、性行為に関連する感染症をいう。
- 2 尖圭コンジローマは、ヒトパピローマウイルスによっておこる。
- 3 梅毒にはペニシリン系抗菌薬が用いられる。
- 4 エイズはヒト免疫不全ウイルス（HIV）感染直後に発症する。

**問題 113** 介護保険制度について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 申請の窓口は都道府県である。
- 2 要介護度は、要支援 1、2 及び要介護 1～5 に区分される。
- 3 初老期認知症と診断された 40 歳の医療保険加入者は、介護保険制度の第 2 号被保険者に該当する。
- 4 介護保険施設で提供される施設サービスは、要介護と認定された被保険者を対象とする。

**問題 114** 高齢者の身体的特徴について、正しいものを一つ選べ。

- 1 肝臓の解毒機能は維持される。
- 2 肺胞表面積が増加する。
- 3 血管壁の弾力性の低下により収縮期血圧が低下する。
- 4 腎臓における糸球体の数が減少し濾過能力は低下する。

**問題 115** 高齢者の認知症について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 アルツハイマー型認知症は、脳血管障害の後遺症である。
- 2 記憶障害は中核症状である。
- 3 妄想や暴力行為は、周辺症状である。
- 4 見当識障害は、時、場所、人が判断できなくなる症状である。

**問題 116** 高齢者の看護について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 失った機能の再獲得ができるように関わる。
- 2 趣味や娯楽など集中できることを見出せるように働きかける。
- 3 できるだけ人と接触をもつように働きかける。
- 4 日常生活の自立に注目した関わりをもつ。

**問題 117** 地域包括支援センターについて、誤っているものを一つ選べ。

- 1 高齢者の住み慣れた地域での生活を支えることに重点がおかれている。
- 2 基本機能の一つに短期入所介護（ショートステイ）サービス事業がある。
- 3 虐待防止など高齢者の権利擁護の事業を担っている。
- 4 介護予防ケアプランを作成する。

**問題 118** 高齢者の疾患の特徴について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 廃用性症候群をおこしやすい。
- 2 異なる器官の疾患を同時にもつことが少ない。
- 3 症状のあらわれ方や薬剤の効果は、高齢になるほど個人差が大きい。
- 4 老化による機能低下から機能障害につながりやすい。

**問題 119** 高齢者の睡眠の援助について、正しいものを一つ選べ。

- 1 室温の調節や照明の調整を行う。
- 2 不眠の改善には、1時間以上の昼寝が有効である。
- 3 入眠導入のため就寝前に運動するようすすめる。
- 4 不眠を訴えた場合は、直ぐに睡眠薬を使用する。

**問題 120** 外来を受診する高齢者の看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 医師に対して思うように話せない場合は黙って見守る。
- 2 生活状態の変化について、家族や介護者から情報を得る必要はない。
- 3 衣類の着脱に時間を要するので急ぐように促す。
- 4 その人らしい生活のなかで疾病のコントロールができているか確認する。

**問題 121** 入院中の高齢者の看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 訴えがないときは、声かけをしない。
- 2 症状の変化に敏感に反応するため、異常の発見がしやすい。
- 3 行動範囲が狭くなり、筋萎縮や関節可動域の低下に至る危険性が高い。
- 4 日常生活の完全自立ができるように援助する。

**問題 122** 高齢者の転倒について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 転倒を予防するには動きやすい服装にする。
- 2 わずかな段差で転倒しやすい。
- 3 転倒の内的要因に平衡機能の低下がある。
- 4 降圧薬の服用は転倒に影響しない。

**問題 123** 高齢者の大腿骨頸部骨折の看護について、正しい組合せを一つ選べ。

- a 人工骨頭置換術後は脱臼を予防するため、股関節を屈曲する。
- b 術後は回復を促進させるため、ベッド上安静を長くする。
- c 一時的にせん妄が起りやすい。
- d 腓骨神経麻痺をおこしやすい。

- 1 a、b      2 a、d      3 b、c      4 c、d

**問題 124** 認知症高齢者の看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 日常生活に変化をつけるため、定期的に病室を変える。
- 2 物を取られたとの思い込みがあるときは、まず先に取られていないことを説明する。
- 3 徘徊しているときは制止する。
- 4 自尊心やプライドを尊重する。

**問題 125** 高齢者の術後せん妄について、正しい組合せを一つ選べ。

- a 主な症状は意識障害（意識混濁）に幻覚、妄想及び興奮などを伴う。
- b 1日のなかで症状の変動はない。
- c 2週間前後に発症する。
- d 苦痛の緩和と安全の確保に努める。

1 a、b      2 a、d      3 b、c      4 c、d

**問題 126** 高齢者の慢性閉塞性肺疾患の看護について、正しい組合せを一つ選べ。

- a 労作時において呼吸困難や咳嗽は出現しない。
- b ADLの低下はみられない。
- c インフルエンザ予防にワクチンの接種をすすめる。
- d 重症になると呼吸不全に陥る。

1 a、b      2 a、d      3 b、c      4 c、d

**問題 127** 次の用語の説明について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 リプロダクティブヘルス／ライツは、性と生殖に関する健康と権利と訳される。
- 2 ドメスティックバイオレンスは、親が子どもに対して行う暴力のことである。
- 3 母子健康手帳は、妊娠、出産、育児に関する母親と子どもの健康の記録である。
- 4 母体保護法は、母体の生命・健康を保護することを目的としている。

**問題 128** 妊娠12週の妊婦の健康診査時の看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 子宮底を測定する。
- 2 胎動を感じるか確認する。
- 3 尿検査で尿糖と尿タンパクの有無を調べる。
- 4 次回は2週間後に来るように説明する。

**問題 129** 妊娠後期の妊婦にとって最も安楽な体位について、正しいものを一つ選べ。

- 1 ファーラー位
- 2 仰臥位
- 3 碎石位
- 4 シムス位

**問題 130** 分娩第3期・4期の看護について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 500ml未満の出血は正常である。
- 2 腹部に温罨法を行う。
- 3 子宮収縮の状態を観察する。
- 4 子宮の輪状マッサージを行う。

**問題 131** アプガースコアについて、誤っているものを一つ選べ。

- 1 新生児仮死の程度を判定する。
- 2 10点満点である。
- 3 7～4点を重症仮死とする。
- 4 5分後のスコアは神経学的予後と相関する。

**問題 132** 産褥1日目の褥婦の経過について、正しいものを一つ選べ。

- 1 子宮底は臍下1横指である。
- 2 悪露は、淡黄色である。
- 3 乳房は左右ともに腫脹し、発赤をみとめる。
- 4 分娩後、自然排尿がない。

**問題 133** 母子感染（垂直感染）について、正しい組合せを一つ選べ。

- a 妊娠、分娩及び授乳を通して、母体に感染している病原微生物が児に感染することをいう。
- b 原因となる病原体に単純ヘルペスウイルスがある。
- c 母体が妊娠後期に風疹に罹患すると、児が先天性風疹症候群を発症する確率が高い。
- d ヒト免疫不全ウイルス（H I V）は、母乳により児に感染することはない。

1 a、b      2 a、d      3 b、c      4 c、d

**問題 134** 小児のてんかん・痙攣<sup>けいれん</sup>性疾患とその看護について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 発作時は誤嚥・窒息を防ぐ。
- 2 てんかんの発作型は、一般発作と特殊発作に分けられる。
- 3 點頭てんかんの発作は、シリーズ形成と呼ばれる特徴がある。
- 4 家族にも、発作時の対応方法を教えておく。

**問題 135** 小児の口唇裂・口蓋裂について、正しいものを一つ選べ。

- 1 言語治療は必要ない。
- 2 外科手術は出生直後に行う。
- 3 治療として形成外科的手術が行われる。
- 4 哺乳障害はない。

**問題 136** 幼児期の生理的特徴について、正しいものを一つ選べ。

- 1 平均睡眠時間は、約 12 時間である。
- 2 脈拍は、1 分間に 130～150 回である。
- 3 収縮期血圧は 50～80 mm Hg である。
- 4 呼吸数は、1 分間に 40～50 回である。

**問題 137** 子どもの熱中症について、正しいものを一つ選べ。

- 1 重症化しても死に至ることはない。
- 2 高体温のときは体を冷やさず保温する。
- 3 体温調節機能が未熟であるため生じやすい。
- 4 倦怠感や悪心は重症度分類 I 度の症状である。

**問題 138** 離乳のすすめ方について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 離乳の開始時期の生後 5～6 か月は、母乳やミルクは飲みただけ与える。
- 2 生後 7～8 か月頃は 1 日 3 回食にすすめていく。
- 3 生後 9～11 か月頃は、家族一緒に楽しい食卓経験ができるようにする。
- 4 生後 12～18 か月頃は、自分で食べる楽しみを手づかみ食べから始める。

**問題 139** E. H. エリクソンによる学童期（児童期）の発達課題について、正しいものを一つ選べ。

- 1 自主性（積極性）対 罪悪感
- 2 勤勉 対 劣等感
- 3 同一性 対 同一性混乱（拡散）
- 4 親密性 対 孤立

**問題 140** 防衛機制について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 退行
- 2 昇華
- 3 共感
- 4 投射（投影）

**問題 141** 次の組合せで、誤っているものを一つ選べ。

- 1 精神病患者監護法 — 私宅監置
- 2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 — 精神障害者保健福祉手帳
- 3 保良 せき — 森田療法
- 4 オイゲン・ブロイラー — 統合失調症

**問題 142** 精神科病棟への入院について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 措置入院は都道府県知事による入院措置である。
- 2 精神保健指定医 2 名の診察を要するのは措置入院である。
- 3 医療保護入院は自傷他害の恐れのある場合に行われる入院形態である。
- 4 任意入院では、本人から退院の申出があった場合、原則としてその者を退院させなければならない。

**問題 143** 思考の障害について、正しいものを一つ選べ。

- 1 せん妄
- 2 カタレプシー
- 3 幻聴
- 4 被害妄想

**問題 144** アルコールの離脱症状について、正しいものを一つ選べ。

- 1 作話
- 2 させられ体験
- 3 幻視
- 4 嫉妬妄想

**問題 145** 向精神薬の副作用とその症状の組合せで、正しいものを一つ選べ。

- |   |           |   |       |
|---|-----------|---|-------|
| 1 | アカシジア     | — | 不随意運動 |
| 2 | 悪性症候群     | — | 高熱    |
| 3 | ジスキネジア    | — | 便秘    |
| 4 | パーキンソン症候群 | — | 口渇    |

**問題 146** 薬物療法を受ける精神疾患患者の看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 指示された服薬回数・量を守るように説明する。
- 2 服薬を拒否する場合は、強い説得や強制的な介入により服薬を確実にする。
- 3 症状が良くなれば自己判断で服薬を調整してもよいと説明する。
- 4 有害作用がある場合には、服薬を中止するように説明する。

**問題 147** 統合失調症について、正しいものを一つ選べ。

- 1 精神科病院の入院患者の5割以上を占める。
- 2 発症のピークは50歳～60歳である。
- 3 興奮や昏迷を特徴とする病型は破瓜型である。
- 4 幻覚は陰性症状である。

**問題 148** 精神症状のある患者への対応について、正しいものを一つ選べ。

- 1 抑うつ状態にある患者には、辛い気持ちに対し励ます。
- 2 幻聴で悪口を言われていると訴える患者には幻聴であると説明する。
- 3 重度（急性期）の躁状態の患者には、看護者が患者の刺激にならないように少し距離をおいて観察する。
- 4 不安を訴える患者には励ます。

**問題 149** 精神科入院患者の身体的拘束と隔離について、正しいものを一つ選べ。

- 1 患者が興奮状態となり、内科医の判断で身体的拘束をおこなった。
- 2 患者の興奮が激しい場合は、理由を説明せず身体拘束してもよい。
- 3 保護室に隔離した場合は、患者への刺激を避けるため看護者の訪室を控える。
- 4 同一の部屋に複数の患者を隔離することはできない。

**問題 150** 精神疾患患者への対応について、正しいものを一つ選べ。

- 1 無為状態の患者には、看護者が日課を計画しそれに従うよう促す。
- 2 うつ病や抑うつ状態患者の自殺は、急性期に発生頻度が高い。
- 3 代理行為は外出外泊ができる患者においても積極的に行う。
- 4 リハビリテーションは入院患者及び地域に居住する患者を対象に行われる。

