

平成 30 年度

関西広域連合 准看護師試験問題

注 意 事 項

試験開始の指示があるまで、試験問題を開かないでください。

- 1 試験問題は 150 問あります。試験時間は 2 時間 30 分です。
- 2 解答用紙（マークシート）に記入されている受験番号が受験票記載の受験番号と一致しているかを確認し、一致していれば解答用紙に氏名、フリガナを正確に記入してください。
- 3 解答は四肢択一となっています。必ず解答用紙に 1 つだけマークしてください。2 つ以上マークすると、その解答は無効になります。
- 4 記入は HB の黒鉛筆又はシャープペンシルを使用し、解答用紙の記載例（「マークの仕方」の良い例）のとおり、濃くはっきりと記入してください。
- 5 解答用紙に誤ってマークしたときは、消しゴムできれいに消してください。
- 6 解答用紙は、折り曲げたり汚したりしないでください。
- 7 解答用紙は持ち帰らないように、必ず提出してください。
- 8 試験開始から 1 時間は退室できません。1 時間が経過した後に退室する方は、解答用紙の氏名と受験番号を再度確認の上、試験監督者に提出し、静かに退室してください。一度退室すると再入室はできません。
- 9 試験終了前 10 分間は退室できません。
- 10 受験票と試験問題は、持ち帰ってください。

試験会場では静粛にし、試験監督者の指示に従ってください。
不正行為や試験監督者の指示に従わないときは、退場を命じ、試験を無効とする場合があります。

問題 1 細胞内にある遺伝情報を有する核内物質について、正しいものを一つ選べ。

- 1 リボソーム
- 2 ゴルジ装置
- 3 ミトコンドリア
- 4 DNA

問題 2 神経組織について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 神経組織は、神経細胞と神経膠細胞（グリア細胞）からなる。
- 2 軸索突起の終末（軸索終末）が、他の神経細胞の樹状突起と連絡する連結部をシナプスという。
- 3 神経膠細胞には、神経細胞に栄養を供給する細胞がある。
- 4 脳や脊髄で神経細胞が集まっている部位を白質という。

問題 3 耳と眼の構造と機能について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 アブミ骨は、鼓膜に連結している。
- 2 音刺激は、蝸牛管のラセン器（コルチ器）の有毛細胞から脳の聴覚中枢に伝わる。
- 3 眼球の内部には眼房水、水晶体、硝子体がある。
- 4 眼球から視神経が出て行く部分を視神経乳頭（視神経円板）という。

問題 4 血液について、正しいものを一つ選べ。

- 1 赤血球の寿命は約 120 日である。
- 2 リンパ球の寿命は約 10 日である。
- 3 血小板の寿命は約 100 日である。
- 4 赤血球は腎臓でこわされる。

問題 5 血液循環について、正しいものの組合せを一つ選べ。

- a 胃、腸、脾臓および膵臓からの静脈は、合して門脈となり肝臓に入る。
- b 脳に血液を供給する動脈は、外頸動脈と椎骨動脈である。
- c チアノーゼとは、血液中に酸素化ヘモグロビンが増加した状態である。
- d 胎児期の動脈管（ボタロー管）は、肺動脈と大動脈を結ぶ。

1 a、b 2 a、d 3 b、c 4 c、d

問題 6 呼吸について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 気管は、第7～8胸椎の高さで、左右の気管支に分かれる。
- 2 呼吸中枢は延髄にある。
- 3 界面活性物質（肺サーファクタント）は、肺胞の伸展に必要である。
- 4 肺胞内の空気と血液との間のガス交換を外呼吸という。

問題 7 腹膜後器官（後腹膜器官）について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 十二指腸
- 2 膵臓
- 3 腎臓
- 4 膀胱

問題 8 脳下垂体前葉から分泌されるホルモンについて、誤っているものを一つ選べ。

- 1 黄体形成ホルモン（LH）
- 2 抗利尿ホルモン（ADH）
- 3 成長ホルモン（GH）
- 4 プロラクチン（PRL）

問題 9 ホルモンと作用の組合せで、誤っているものを一つ選べ。

- 1 サイロキシン — 基礎代謝（エネルギー代謝）の亢進
- 2 メラトニン — 消炎作用（抗炎症作用）
- 3 パラソルモン（パラトルモン） — 血中カルシウム濃度の調整
- 4 ノルアドレナリン — 血圧上昇

問題 10 高血圧症の食事療法について、正しいものを一つ選べ。

- 1 高エネルギー食の摂取
- 2 塩分の制限
- 3 タンパク質の制限
- 4 水分の制限

問題 11 次のうち、誤っているものを一つ選べ。

- 1 高齢者の低栄養は、重要な栄養問題の一つである。
- 2 BMI の計算式は、身長（m）×身長（m）×22 である。
- 3 基礎代謝とは、身体的、精神的に安静にしている状態での代謝量であり、生命維持に最低限必要なエネルギーである。
- 4 メタボリックシンドロームの診断基準の一つであるウエスト（臍周囲）径は、女性では 90 cm 以上である。

問題 12 ビタミンについて、正しいものを一つ選べ。

- 1 ビタミンは、必要量が体内で産生される。
- 2 ビタミンB₁は、糖質代謝の補酵素として働く。
- 3 ビタミンEは、水溶性ビタミンである。
- 4 口内炎は、ビタミンDの欠乏による。

問題 13 内視鏡器具に使用される消毒薬について、正しいものを一つ選べ。

- 1 ベンザルコニウム塩化物（逆性石けん）
- 2 グルタラール（グルタルアルデヒド）
- 3 ポビドンヨード
- 4 次亜塩素酸ナトリウム

問題 14 薬剤と副作用の組合せで、誤っているものを一つ選べ。

- | | | | |
|---|------------|---|---------|
| 1 | イソニアジド | — | 聴力障害 |
| 2 | クロラムフェニコール | — | 再生不良性貧血 |
| 3 | ジギタリス | — | 徐脈 |
| 4 | アスピリン | — | 胃腸障害 |

問題 15 糖質コルチコイドの作用について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 脂質の増加（脂肪同化作用）
- 2 抗炎症作用
- 3 免疫抑制作用
- 4 血糖の低下作用

問題 16 病気の原因が主に内因によるものについて、正しいものを一つ選べ。

- 1 公害病
- 2 医原病
- 3 染色体異常
- 4 寄生虫症

問題 17 体液循環の異常について、正しいものを一つ選べ。

- 1 心不全は、うっ血の原因となる。
- 2 他の部位から流れてきた異物などが、血管内腔を閉塞したものを血栓という。
- 3 一度できた血栓は、器質化したのち再疎通しない。
- 4 心筋梗塞は、敗血症性（細菌性）ショックの原因となる。

問題 18 炎症について、正しいものを一つ選べ。

- 1 発赤、発汗、発熱、疼痛、機能障害を炎症の5徴候という。
- 2 急性炎症では、主に好中球が反応する。
- 3 慢性炎症では、主に血小板が反応する。
- 4 梅毒では、乾酪壊死（巢）がみられる。

問題 19 悪性腫瘍について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 増殖細胞の異型性は軽度である。
- 2 浸潤や転移をおこす。
- 3 肉腫は悪性腫瘍の一種である。
- 4 がんの原因となるウイルスが存在する。

問題 20 内分泌疾患について、正しいものを一つ選べ。

- 1 メルゼブルグの三徴とは、徐脈、眼球突出および甲状腺腫である。
- 2 クッシング症候群は、主に副甲状腺の異常により生じる。
- 3 褐色細胞腫では、カテコールアミンの分泌過剰により高血圧や高血糖をおこす。
- 4 1型糖尿病では、膵ランゲルハンス島 α 細胞からのインスリン分泌が低下する。

問題 21 脳・神経疾患について、正しいものを一つ選べ。

- 1 脳内出血は、被殻や視床で発生することが多い。
- 2 脳動脈瘤は、硬膜外血腫の原因となる。
- 3 アルツハイマー病では、大脳の腫脹がみられる。
- 4 肺がんや乳がんは、脳転移をおこしにくい。

問題 22 細菌について、正しいものを一つ選べ。

- 1 A群レンサ球菌（化膿レンサ球菌）は、猩紅熱、リウマチ熱および腎炎の原因となる。
- 2 腸球菌の中に耐性菌は存在しない。
- 3 カンピロバクターには、エリスロマイシンは無効である。
- 4 ヘリコバクターピロリ菌は、胃潰瘍の原因とはならない。

問題 23 ウイルスについて、正しいものを一つ選べ。

- 1 ウイルスの培養には人工培地を用いる。
- 2 水痘と帯状疱疹は、同じウイルスが原因である。
- 3 風疹ウイルスは、妊婦には感染しない。
- 4 日本脳炎ウイルスは、ダニによって媒介される。

問題 24 原虫が原因となる疾患について、正しいものを一つ選べ。

- 1 百日咳
- 2 破傷風
- 3 アメーバ赤痢
- 4 ニューモシスチス肺炎

問題 25 インフォームドコンセントについて、誤っているものを一つ選べ。

- 1 患者の権利章典（アメリカ病院協会、1973年）に明記されている。
- 2 医師のパターナリズムが推奨されている。
- 3 患者が治療を拒否する権利が含まれる。
- 4 患者が治療に伴う副作用の説明を求める（受ける）権利が含まれる。

問題 26 次のうち、誤っているものを一つ選べ。

- 1 看護者の倫理綱領（日本看護協会、2003年）では、看護者は、人間の生命、人間としての尊厳及び権利を尊重するとある。
- 2 生命倫理（バイオエシックス）とは、道徳的価値観から、医療関係者の態度や行為について研究するものである。
- 3 わが国では、尊厳死が法的に制定されている。
- 4 リビングウィルは、終末期の医療の選択について、事前に意思表示をしておく文書（生前遺言書）である。

問題 27 次のうち、正しいものを一つ選べ。

- 1 不安とは、特定の明確化された危険や脅威に直面したときに生じる情動である。
- 2 ストレッサーとは、有害刺激にさらされた生体に生じたゆがみをいう。
- 3 防衛機制の置き換えとは、低レベルの発達段階に逆戻りすることをいう。
- 4 病者役割とは、健康を害していることによる社会的役割からの免除と、病者として期待される役割である。

問題 28 患者の心理について、正しいものを一つ選べ。

- 1 急性期では、急激な状態の変化に不安や恐怖を感じる。
- 2 回復期では、後遺症や再発に対する不安が解消し、障害を受入れる。
- 3 慢性期では、急激な症状の変化や重症化への不安はない。
- 4 終末期は、身体的苦痛だけを感じ、精神的苦痛を感じることはない。

問題 29 フィンクの危機モデルについて、誤っているものを一つ選べ。

- 1 第一段階は衝撃である。
- 2 第二段階は防衛的退行である。
- 3 第三段階は否認である。
- 4 第四段階は適応である。

問題 30 次のうち、正しいものを一つ選べ。

- 1 予防接種法にもとづく予防接種には、定期と臨時の予防接種がある。
- 2 人工妊娠中絶は、母子保健法で定められている。
- 3 児童福祉法でいう児童とは15歳未満をいう。
- 4 臓器売買の禁止は、身体障害者福祉法で定められている。

問題 31 保健医療福祉に関する制度について、正しいものを一つ選べ。

- 1 学校保健安全法の対象に幼稚園は含まれない。
- 2 労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
- 3 特定健康診査・特定保健指導の対象は、40～80歳の被保険者と被扶養者である。
- 4 がん対策のためのがん登録は、健康増進法で定められている。

問題 32 保健師助産師看護師法について、正しいものを一つ選べ。

- 1 准看護師は、名称独占ではない。
- 2 准看護師は、相対的欠格事由に該当するに至ったとき又は准看護師としての品位を損なうような行為があった場合は、行政処分の対象となることがある。
- 3 准看護師の業は、傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助並びに保健指導に従事することとされている。
- 4 准看護師業務を行うことができるのは、准看護師試験合格証書を受け取った時からである。

問題 33 法律と規定内容の組合せで、誤っているものを一つ選べ。

- | | | | |
|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 生活保護法 | — | 医療扶助 |
| 2 | 難病の患者に対する医療等に関する法律 | — | 特定医療費 |
| 3 | 身体障害者福祉法 | — | 身体障害者手帳の交付 |
| 4 | 健康保険法 | — | 介護給付 |

問題 34 次のうち、誤っているものを一つ選べ。

- 1 国際生活機能分類（ICF）では、人間の生活機能を、心身機能・身体構造、活動および参加に分類している。
- 2 ヘルスプロモーションとは、人々が自らの健康とその決定要因をコントロールし、改善することができるようにするプロセスである。
- 3 健康日本 21（第2次）の基本的な方向の一つに、平均寿命の延伸と経済格差の縮小がある。
- 4 日本国憲法では、健康で文化的な最低限度の生活を営むことを国民の権利としている。

問題 35 看護理論家と理論の組合せで、正しいものを一つ選べ。

- | | | | |
|---|---------|---|----------|
| 1 | ナイチンゲール | — | 基本的ニード論 |
| 2 | ペプロウ | — | 人間関係の看護論 |
| 3 | オレム | — | 適応看護理論 |
| 4 | ヘンダーソン | — | セルフケア理論 |

問題 36 マズローによる人間のニードの階層（欲求階層説）について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 ニードは5段階の階層によって示される。
- 2 生理的ニードには、栄養、排泄および睡眠がある。
- 3 所属と愛のニードは、承認(自尊)のニードよりも上位の階層にある。
- 4 自己実現のニードは、自己の能力を発揮し、自分の可能性を最大限に発揮しようとするニードである。

問題 37 災害看護について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 災害看護とは、災害に関する看護独自の知識や技術を体系的にかつ柔軟に用いるとともに、他の専門分野と協力して、災害の及ぼす生命や健康生活への被害を極力少なくするための活動を展開することである。
- 2 心的外傷後ストレス障害（PTSD）を考慮した、こころのケアを行う。
- 3 トリアージとは、1人でも多くの命を救うために、治療・搬送の優先順位をつけることをいう。
- 4 トリアージ・タグの赤色は死亡を示す。

問題 38 医療安全について、正しいものの組合せを一つ選べ。

- a インシデントとは、適切な処理が行われず、事故となってしまったことがらをいう。
- b 事故の予防に重点をおく場合には、個人の責任追及よりも原因を究明し、その防止のための対策を立てることが重要である。
- c SHELLモデルは、インシデントやアクシデントの分析方法である。
- d ヒューマンエラーは、個人の努力でゼロにすることができる。

1 a、b 2 a、d 3 b、c 4 c、d

問題 39 患者と看護者の関係成立について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 患者と話すときは、相手の顔や目を見てアイコンタクトをとる。
- 2 すべての質問は、患者が「はい」「いいえ」で答えられるようにする。
- 3 患者をよく知るためには、傾聴が大切である。
- 4 自己紹介は、信頼関係を築くために重要である。

問題 40 看護過程について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 アセスメント、看護診断、計画立案、実施、評価の5つの構成要素からなる。
- 2 情報の整理には、ゴードンの機能的健康パターンを活用する。
- 3 看護問題の優先順位の決定には、マズローの欲求階層を参考とする。
- 4 看護計画は、疾患名が明確になってから立案する。

問題 41 グラスゴー・コーマ・スケール（GCS）について、正しいものを一つ選べ。

- 1 開眼、言語反応（発語）および運動反応を評価する。
- 2 呼びかけにより開眼すれば、4点である。
- 3 理解不明の声を発す場合は、1点である。
- 4 合計点が低いほど軽症である。

問題 42 クリティカルパスについて、正しいものを一つ選べ。

- 1 患者の問題ごとに、治療やケアの経過を記録したものである。
- 2 患者の治療やケアに対する特定の反応や症状に、焦点を当てたものである。
- 3 患者の経過や情報について、要点をまとめたものである。
- 4 入院から退院までの標準的な看護計画を示したものである。

問題 43 呼吸の異常について、正しいものを一つ選べ。

- 1 成人の場合、1分間に24回以上の呼吸を過呼吸という。
- 2 異常に深く大きな呼吸が持続するのをビオー呼吸という。
- 3 呼吸困難時に、下顎が動いている呼吸を起座呼吸という。
- 4 チェーン・ストークス呼吸は、脳出血やアルコール中毒患者にみられる。

問題 44 バイタルサイン測定について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 呼吸音を聴診する場合は、患者が協力できる範囲で深呼吸を促す。
- 2 患者の脈拍を初めて測定するときは、左右の橈骨動脈を同時に触診する。
- 3 麻痺がある患者の血圧測定は、健側で行う。
- 4 口腔検温は、意識障害のある患者に適している。

問題 45 病室環境について、正しいものを一つ選べ。

- 1 ベッド周囲の整理整頓は、看護者の役割ではない。
- 2 温度が一定に設定された病室では、患者の状態に合わせて掛物などで調整する。
- 3 看護者の話し声や靴音、器具の音は、患者に安心感を与える。
- 4 室内湿度は、20～30%が望ましい。

問題 46 体位変換の援助について、正しいものを一つ選べ。

- 1 看護者は、支持基底面を狭くした姿勢で行う。
- 2 仰臥位から側臥位にする場合は、患者の膝を伸ばした状態で行う。
- 3 水平移動する場合は、患者の両腕を組み、両膝を立て身体を小さくまとめる。
- 4 水平移動時に、看護者と患者の負担を軽くするには、患者を持ち上げて移動させる。

問題 47 食事の援助について、正しいものを一つ選べ。

- 1 治療食は、栄養士の食事箋に基づいてつくられる。
- 2 視力障害のある患者には、食事内容などを具体的に説明する。
- 3 患者の状態に関わらず、患者の体位は側臥位にする。
- 4 患者の口に運ぶ1回量の食物は多めにする。

問題 48 排泄の援助について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 便秘の患者には、腰・腹部の温罨法をすすめる。
- 2 床上での排泄時は、患者が腹圧をかけやすいように体位を整える。
- 3 便器を使用する際は、肛門部が便器の端にくるように調整する。
- 4 排泄後は、排泄物の量、性状および皮膚の状態などを観察する。

問題 49 ベッド上での清潔の援助について、正しいものを一つ選べ。

- 1 清拭時のベッドは、看護者が援助しやすい高さに調節する。
- 2 下肢の清拭時は、患者の足関節を支えて下肢を安定させる。
- 3 熱布清拭は70℃のお湯で行う。
- 4 エタノールを使用しての洗髪では、70%エタノールを用いる。

問題 50 寝衣交換について、正しいものを一つ選べ。

- 1 寝衣は、通気性の低いものを選ぶ。
- 2 麻痺のある患者の場合は、健側から着せる。
- 3 ズボンの着脱は、可能であれば膝を立てた状態で行う。
- 4 身体に汚れがある場合、清拭する前に寝衣を交換する。

問題 51 移動・移送の援助について、正しいものの組合せを一つ選べ。

- a 車いすへの移乗の際は、ベッドに対して80～90度の角度に車いすを置く。
- b 車いすで段差を上がる時は、ティッピングレバーを踏んで前輪を持ち上げる。
- c 車いすでスロープを下るときは、患者が後ろ向きになるように進む。
- d ストレッチャーでの移送は、原則として看護者1名で行う。

- 1 a、b 2 a、d 3 b、c 4 c、d

問題 52 感染予防について、正しいものの組合せを一つ選べ。

- a 保護隔離は、感染源である患者を非感染者とは違う場所に離すことである。
- b 健康な看護師が感染源になることはない。
- c 血液が付着したガーゼは、橙色のバイオハザードマークの付いた容器に捨てる。
- d 看護行為の前後には、必ず手洗いをを行う。

1 a、b 2 a、d 3 b、c 4 c、d

問題 53 診療器具の取扱いについて、正しいものを一つ選べ。

- 1 ディスポーザブル製品は、2回使用したら捨てる。
- 2 ディスポーザブル製品は、使用期限を確認してから使用する。
- 3 金属製の鑷子や鉗子の使用後は、塩素系消毒剤に浸す。
- 4 ゴム製品の使用後は、水分を残して保管する。

問題 54 浣腸について、正しいものを一つ選べ。

- 1 バリウム浣腸は、排泄を促す目的で行う。
- 2 浣腸実施時の体位は、原則として右側臥位とする。
- 3 カテーテル挿入時は、口呼吸を促す。
- 4 成人の場合、浣腸液の注入速度は3秒間で20mL程度とする。

問題 55 褥瘡について、正しいものを一つ選べ。

- 1 栄養状態の低下は、褥瘡発生の要因にはならない。
- 2 肘頭部は、側臥位時の褥瘡の好発部位である。
- 3 米国褥瘡諮問委員会（NPUAP）では、深達度により8病期に分類される。
- 4 予防には、腸骨や仙骨部の圧迫を避けるため、30度の側臥位が望ましい。

問題 56 持続的導尿について、正しいものを一つ選べ。

- 1 尿量を正確に測定する必要がある場合に行う。
- 2 ネラトンカテーテルを使用する。
- 3 カテーテルを挿入し尿の流出を認めたら、その位置で留置する。
- 4 女性の場合、カテーテルは大腿部の後面に固定する。

問題 57 栄養法について、正しいものを一つ選べ。

- 1 栄養補給の方法や内容は、患者の状態に応じて看護職が決定する。
- 2 成人の場合、経鼻栄養チューブは 18Fr を使用する。
- 3 中心静脈栄養法は、高カロリー栄養剤を持続的に点滴注入する。
- 4 栄養剤を胃ろうへ注入するときは、右側臥位とする。

問題 58 中心静脈栄養法のカテーテルを留置する血管について、正しいものを一つ選べ。

- 1 肺静脈
- 2 腋窩静脈
- 3 膝窩静脈
- 4 上大静脈

問題 59 温罨法について、正しいものを一つ選べ。

- 1 ホットパックは、乾性温罨法である。
- 2 副交感神経を活発にする効果がある。
- 3 金属製の湯たんぽを使用する場合は、60℃のお湯を準備する。
- 4 湯たんぽを使用する場合は、温めたい場所から 5cm 以内に置く。

問題 60 酸素濃度 70%以上で投与するための器具について、正しいものを一つ選べ。

- 1 フェイスマスク
- 2 リザーバー（付）マスク
- 3 ベンチュリーマスク
- 4 鼻カニューレ

問題 61 内服薬の与薬時期について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 食前薬は、食事の直前に服用する。
- 2 食間薬は、食後 2 時間程度経過後に服用する。
- 3 食後薬は、食後 30 分以内に服用する。
- 4 頓用薬は、症状が出現した時に服用する。

問題 62 筋肉内注射の適切な部位について、正しいものの組合せを一つ選べ。

- a 中殿筋
- b 三角筋
- c 大腿四頭筋
- d 上腕三頭筋

- 1 a、b 2 a、d 3 b、c 4 c、d

問題 63 検体検査について、正しいものの組合せを一つ選べ。

- a 喀痰を採取する前に、含嗽を促す。
- b 抗凝固剤の入っている採血容器の場合は、ゆっくり転倒し血液と混和させる。
- c 蓄尿は、開始時刻から終了時刻までの全量を容器に入れる。
- d 便潜血反応検査の場合は、食事の制限はない。

- 1 a、b 2 a、d 3 b、c 4 c、d

問題 64 胸腔穿刺について、正しいものを一つ選べ。

- 1 穿刺部は、前腋窩線上である。
- 2 体位は、腹臥位とする。
- 3 穿刺する時には、深呼吸を促す。
- 4 穿刺後は、胸痛、咳嗽および血痰の有無を観察する。

問題 65 気管内吸引について、正しいものの組合せを一つ選べ。

- a 吸引圧は、30kPa (225mmHg)である。
- b カテーテルを挿入する際には、折り曲げ、吸引力をなくす。
- c 感染予防のため無菌操作で行う。
- d 1回の吸引は、20～25秒で行う。

1 a、b 2 a、d 3 b、c 4 c、d

問題 66 与薬における6つのR(Right)について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 Right Place (正しい場所)
- 2 Right Drug (正しい薬)
- 3 Right Purpose (正しい目的)
- 4 Right Dose (正しい用量)

問題 67 経過別看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 急性期は、生命維持のために医療処置を優先し、日常生活の援助は行わない。
- 2 慢性期は、患者自身が主体的に生活を改善し、セルフケアができるように援助する。
- 3 回復期は、心身ともに安定した状態であり、看護者の支援は必要とされない。
- 4 終末期の緩和ケアには、入院が必須である。

問題 68 全身麻酔の目的について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 意識の消失
- 2 神経反射の亢進
- 3 鎮痛
- 4 筋の弛緩・筋緊張の消失

問題 69 安静療法の意義について、正しいものを一つ選べ。

- 1 エネルギー代謝が促進できる。
- 2 呼吸器系（呼吸機能）への負担が軽減できる。
- 3 筋力低下が予防できる。
- 4 腸管運動が亢進し、便通がよくなる。

問題 70 一次救命処置について、正しいものを一つ選べ。

- 1 医師の指示で行う救命処置のことである。
- 2 成人に対する胸骨圧迫は、患者の胸骨の下半分に実施者の両手を重ねて置き、肘をまっすぐに伸ばして行う。
- 3 自動体外式除細動器（AED）は使用しない。
- 4 胸骨圧迫と人工呼吸を同時に行う場合、成人では15対2の割合で行う。

問題 71 輸液療法を受ける患者の看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 経口摂取が可能な場合でも禁飲食とする。
- 2 カテーテル挿入中は、シャワー浴や入浴は実施しない。
- 3 患者が必要以上に活動を制限しないように、動かしてよい部分と動き方を説明する。
- 4 刺入部の観察は、被覆用ドレッシングフィルムを必ず外して行う。

問題 72 ムーアによる術後患者の回復過程の第 2 相(転換期)について、正しいものを一つ選べ。

- 1 周囲への関心が戻る。
- 2 体温が上昇する。
- 3 体重が増加する。
- 4 心拍数が増加する。

問題 73 放射線療法と安全管理について、正しいものを一つ選べ。

- 1 小線源療法は、リニアックを使用して外部照射する治療法のことである。
- 2 放射線を取り扱う医療従事者は、希望者のみ個人線量計を装着する。
- 3 放射線の吸収線量を表す単位は、シーベルト(Sv)を用いる。
- 4 被曝量^{ひばくりょう}は、時間に比例し距離の 2 乗に反比例する。

問題 74 ショックの徴候について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 血圧上昇
- 2 顔面蒼白・四肢冷感
- 3 虚脱
- 4 頻脈

問題 75 終末期ケアについて、正しいものを一つ選べ。

- 1 予期的悲嘆とは、患者が死亡した時の家族の悲しみのことをいう。
- 2 キューブラー・ロスによる死の受容段階とは、残された家族の心理傾向を 5 段階に分類したものである。
- 3 患者が亡くなった後は、患者と家族だけにしないように配慮する。
- 4 宗教や慣習上の要望に配慮する。

問題 76 痛みのある患者の看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 痛みのレベルは、JCS（ジャパン・コーマ・スケール）で把握する。
- 2 痛みのある部分の筋肉は、弛緩していることが多い。
- 3 急性の炎症を伴う局所の痛みの場合は、温罨法を行う。
- 4 がん性疼痛は、麻薬性鎮痛薬（モルヒネなど）の使用により、コントロールされる。

問題 77 成人期の慢性疾患患者の特徴について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 発病や経過には、個人の生活習慣が関係している。
- 2 急性増悪しない。
- 3 家庭や職場での役割に影響がある。
- 4 生涯にわたり自己管理を必要とする。

問題 78 呼吸器疾患と検査の組合せで、正しいものを一つ選べ。

- | | | | |
|---|----------|---|-----------------------------------|
| 1 | 自然気胸 | — | 細菌培養 |
| 2 | 気管支喘息 | — | 気管支鏡 |
| 3 | 肺結核 | — | 喀痰塗抹検査
<small>かくたんともまつ</small> |
| 4 | 慢性閉塞性肺疾患 | — | 肺生検 |

問題 79 肺切除術を受ける患者の看護について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 手術に備えて、禁煙の必要性を説明する。
- 2 術前から、胸式呼吸の練習を行う。
- 3 術後は、呼吸状態とドレーンからの排液の状態を観察する。
- 4 術後早期から、上肢の運動を開始する。

問題 80 パルスオキシメーターによる酸素飽和度測定について、正しいものを一つ選べ。

- 1 静脈血中の酸素飽和度を測定する。
- 2 測定値は、S p O₂と記載する。
- 3 侵襲的検査である。
- 4 成人の酸素飽和度の基準値は、80～90%である。

問題 81 気管支喘息患者の看護について、正しいものの組合せを一つ選べ。

- a 呼吸困難や咳嗽の発作は、夜間から早朝にかけて出現しやすい。
- b 発作時の治療には、長時間作用性β₂刺激薬が使用される。
- c 発作時は、仰臥位にする。
- d 感冒の予防が必要であることを説明する。

1 a、b 2 a、d 3 b、c 4 c、d

問題 82 悪心・嘔吐のある患者の看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 仰臥位しかとれない場合は、顔を横に向けて吐物の誤嚥を防ぐ。
- 2 症状を緩和させるために、胃部の温罨法を行う。
- 3 吐物に鮮紅色の泡立つ血液が混入したときは、消化管出血を疑う。
- 4 嘔吐後の含嗽は、誤嚥の危険があるので行わない。

問題 83 消化器疾患と症状の組合せで、正しいものを一つ選べ。

- | | | | |
|---|--------|---|---------|
| 1 | 逆流性食道炎 | — | 背部痛 |
| 2 | 急性膵炎 | — | 胸やけ |
| 3 | 劇症肝炎 | — | 意識障害 |
| 4 | 胆石症 | — | 左肩への放散痛 |

問題 84 潰瘍性大腸炎の患者の看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 急性期（活動期）は、高エネルギー食の摂取を促す。
- 2 内科的治療のみで、手術適応はない。
- 3 感染予防の自己管理が重要であることを説明する。
- 4 副腎皮質ホルモン薬は、症状に合わせて自分で服用量を増減するよう説明する。

問題 85 腸閉塞症（イレウス）について、正しいものを一つ選べ。

- 1 術後の腸の癒着によるものは、麻痺性イレウスである。
- 2 排ガスや排便の停止は、完全閉塞の徴候である。
- 3 食事は流動食とする。
- 4 症状が回復するまでは、安静臥床を促す。

問題 86 人工肛門（ストーマ）造設術を受ける患者の看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 ストーマ造設の位置は、ベルトラインに合わせる。
- 2 ストーマのセルフケアの説明は、術後に行う。
- 3 術後は、食事や薬などにより、便の性状を調整するよう説明する。
- 4 入浴時は、必ず入浴用装具をつけるよう説明する。

問題 87 循環器疾患の症状について、正しいものを一つ選べ。

- 1 心房細動では、脈拍は規則的である。
- 2 心不全の主な症状は、労作時呼吸困難である。
- 3 心機能の重症度評価には、ヒュー・ジョーンズの分類が用いられる。
- 4 心臓性の浮腫は、上肢や手背に生じる。

問題 88 ホルモンと疾患の組合せで、誤っているものを一つ選べ。

- | | | | |
|---|-------------------|---|----------|
| 1 | 成長ホルモン（GH）の分泌過剰 | — | 先端巨大症 |
| 2 | 慢性的なコルチゾールの分泌過剰 | — | クッシング症候群 |
| 3 | プロラクチン（PRL）の分泌過剰 | — | プロラクチノーマ |
| 4 | 抗利尿ホルモン（ADH）の分泌過剰 | — | 尿崩症 |

問題 89 循環器疾患の検査について、正しいものを一つ選べ。

- 1 胸部X線で心胸郭比40%を超えると、心拡大が指摘される。
- 2 トレッドミル検査は、連続的に24時間以上の心電図の記録を行うものである。
- 3 心エコー検査は、心臓に超音波を発信して、反射波を受信・画像化するものである。
- 4 右心カテーテル法による検査は、動脈からカテーテルを挿入する。

問題 90 心臓疾患患者の看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 冠危険因子（肥満・喫煙・高血圧・脂質異常・糖尿病・運動不足・ストレス）の把握が重要である。
- 2 心筋梗塞発症直後から、トイレでの排泄を誘導する。
- 3 急性心不全の患者の体位は、仰臥位とする。
- 4 ワルファリン使用患者には、納豆やクロレラを積極的に食べるよう促す。

問題 91 血液疾患について、正しいものの組合せを一つ選べ。

- a 巨赤芽球性貧血は、鉄欠乏でおこる。
- b 再生不良性貧血の主な症状は、貧血、易感染性および出血傾向である。
- c 多発性骨髄腫では、病的骨折や腰椎圧迫骨折による腰痛が出現することが多い。
- d 急性リンパ性白血病は、高齢者に多い。

- 1 a、b 2 a、d 3 b、c 4 c、d

問題 92 甲状腺疾患について、正しいものを一つ選べ。

- 1 甲状腺機能亢進症では、粘液水腫がみられる。
- 2 バセドウ病は、20～30歳の女性に好発する。
- 3 慢性甲状腺炎は、甲状腺機能低下症の原因となる頻度は低い。
- 4 甲状腺機能低下症では、発汗や頻脈がみられる。

問題 93 糖尿病について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 血糖値 50 mg/dlでは、冷汗、手指の振戦などの症状が出現する。
- 2 インスリン注射の部位で、吸収速度が一番遅いのは腹部である。
- 3 慢性合併症の大血管症には、脳梗塞がある。
- 4 糖尿病の運動療法は、有酸素運動が望ましい。

問題 94 造血器の疾患について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 急性前骨髄球性白血病は、DICを合併するのが特徴である。
- 2 慢性骨髄性白血病は、脾腫が特徴である。
- 3 悪性リンパ腫のうち、ホジキンリンパ腫は約半数を占める。
- 4 成人T細胞白血病（ATL）は、九州地方に多くみられる。

問題 95 ギラン - バレー症候群について、正しいものを一つ選べ。

- 1 発症後に、カンピロバクターなどによる感染症をおこす。
- 2 両下肢の近位筋にのみ、筋力低下がおこる。
- 3 顔面、呼吸、嚥下にかかわる筋肉に麻痺が生じる。
- 4 筋力低下や神経症状は、2～3週間で完治することが多い。

問題 96 多発性硬化症について、正しいものを一つ選べ。

- 1 急性期の治療には、インターフェロンが有効である。
- 2 再発予防には、副腎皮質ステロイドによるパルス療法が有効である。
- 3 複視などの眼球運動障害は、症状の一つである。
- 4 寛解と増悪を繰り返すことはない。

問題 97 腰椎穿刺による脳脊髄液検査について、正しいものを一つ選べ。

- 1 頭蓋内圧亢進が疑われる場合に実施する。
- 2 穿刺部位は、第1・2腰椎間である。
- 3 正常な髄液は、白色混濁液である。
- 4 検査後1～2時間程度は、水平仰臥位を保つ。

問題 98 頭部外傷について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 脳震盪^{のうしんとう}では、逆行性健忘や外傷後健忘がみられる。
- 2 急性硬膜下血腫の予後は、良好である。
- 3 急性硬膜外血腫では、意識清明期がある。
- 4 脳挫傷^{のうざしょう}では、脳内血腫の形成がみられる。

問題 99 四肢切断術を受ける患者の看護について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 上肢の場合、術前から利き手交換の訓練を行う。
- 2 下肢の場合、術直後から車いす操作や松葉杖歩行の訓練を行う。
- 3 下肢の場合、自分で包帯が巻けるように、術後に方法を説明する。
- 4 術後は、断端部の近位関節の屈曲拘縮を予防する。

問題 100 関節外傷について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 捻挫では、関節内外の出血による関節部の腫脹がみられる。
- 2 反復性脱臼は、肘関節でおこりやすい。
- 3 脱臼後は、徒手整復し安静のため固定する。
- 4 膝内障には、半月板損傷、側副靭帯損傷および十字靭帯損傷が含まれる。

問題 101 関節の動きと可動域の組合せで、誤っているものを一つ選べ。

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| 1 | 肩関節の屈曲 | — | 0～360度 |
| 2 | 肘関節の伸展 | — | 0～5度 |
| 3 | 股関節の内転 | — | 0～20度 |
| 4 | 膝関節の伸展 | — | 0度 |

問題 102 腎・泌尿器系腫瘍について、正しいものを一つ選べ。

- 1 ウィルムス腫瘍は、40歳以上に多い。
- 2 膀胱腫瘍は、主に排尿時痛を伴う血尿がある。
- 3 前立腺がんは、進行してから排尿障害が出現する。
- 4 腎細胞がんは、腫瘍の大きさにかかわらず根治的腎摘出術を行う。

問題 103 急性腎盂腎炎患者の看護について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 悪寒戦慄、腰背部痛および排尿時痛を観察する。
- 2 尿の混濁を観察する。
- 3 安静を保つ。
- 4 水分摂取を制限する。

問題 104 急性腎不全患者の看護について、正しいものの組合せを一つ選べ。

- a クレアチニンや尿素窒素（BUN）を観察する。
- b 心胸比（心胸郭比）、心電図などを観察する。
- c 乏尿（無尿）期は、前日の尿量に 1000 mlを加えた範囲内の水分摂取を促す。
- d 乏尿（無尿）期は、脂質を制限した食事療法を行う。

1 a、b 2 a、d 3 b、c 4 c、d

問題 105 子宮筋腫について、正しいものを一つ選べ。

- 1 平滑筋由来の悪性腫瘍である。
- 2 90～95%は子宮頸部に発生する。
- 3 過多月経がおこる。
- 4 不妊の原因にはならない。

問題 106 乳腺線維腺腫の触診所見について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 表面が凹凸^{おとつ}である。
- 2 境界が明瞭である。
- 3 かたい（弾性硬）。
- 4 可動性がある。

問題 107 皮膚腫瘍について、正しいものを一つ選べ。

- 1 基底細胞がんは、顔面にできやすい黒色の腫瘤で、潰瘍化することが多い。
- 2 皮膚悪性リンパ腫の予後は、良好である。
- 3 有棘細胞がんでは、外科的な切除は行わない。
- 4 悪性黒色腫の予後は、良好である。

問題 108 緑内障について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 急性緑内障の発作時は、眼痛のほかに、頭痛や吐き気などの症状が生じる。
- 2 開放隅角緑内障では、視野欠損がみられる。
- 3 日本人では眼圧の高い緑内障が、正常眼圧緑内障より多い。
- 4 緑内障の治療の基本は、点眼による眼圧コントロールである。

問題 109 中耳炎とその看護について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 急性中耳炎は、上気道の細菌が耳管を経て感染することで発症する。
- 2 急性中耳炎では、鼓膜穿孔はおこらない。
- 3 慢性中耳炎は、慢性穿孔性中耳炎（慢性化膿性中耳炎）と真珠腫性中耳炎に区別される。
- 4 急性中耳炎患者には、鼻を強くかまないように説明する。

問題 110 歯・口腔疾患について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 歯髄まで進行したう蝕の進行程度は、C₃（第3度）である。
- 2 歯周病は、糖尿病などの全身的な疾患と関連する。
- 3 唾液腺に生じた結石をガマ腫という。
- 4 口腔カンジダ症は日和見感染である。

問題 111 感染症と潜伏期間の組合せで、正しいものを一つ選べ。

- | | | | |
|---|------------------|---|-----------------|
| 1 | 風疹 | — | 2~3 週間（平均 17 日） |
| 2 | 麻疹 | — | 3~4 週間（平均 24 日） |
| 3 | 後天性免疫不全症候群（AIDS） | — | 1~2 週間（平均 10 日） |
| 4 | 水痘 | — | 1 週間（平均 6 日） |

問題 112 不妊症について、正しいものを一つ選べ。

- 1 性生活をおこなっているにも関わらず、6 か月経っても妊娠しない状態を不妊症という。
- 2 女性側の不妊の原因は、子宮障害が最も多い。
- 3 不妊の原因が男性側にある割合は、約 15%である。
- 4 排卵障害の治療には、ゴナドトロピンなどの排卵誘発剤が用いられる。

問題 113 加齢による変化について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 恒常性維持機能の低下により、回復力、予備力、防衛力および適応力が低下する。
- 2 自分の健康に過度にとらわれる心気性（心気状態）がみられることがある。
- 3 自己中心性や猜疑心は、知的機能の低下により、自己抑制が利かなくなることや不安から引き起こされる。
- 4 結晶性知能の低下により、新しいことの学習が困難になる。

問題 114 高齢者の特徴について、正しいものを一つ選べ。

- 1 E. H. エリクソンによる老年期の発達課題は、自我の統合である。
- 2 サクセスフルエイジングとは、高齢であることにより、社会的不利益をこうむる状態をいう。
- 3 手続き記憶は、加齢の影響を受けやすい。
- 4 老化現象は、誰にも一様に現れるもので、現れ方の個人差は小さい。

問題 115 高齢者虐待について、正しいものを一つ選べ。

- 1 虐待の種類には、身体的虐待、介護・世話の放棄・放任、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待がある。
- 2 心理的虐待が最も多い。
- 3 虐待者は、被虐待者の配偶者が最も多い。
- 4 虐待が疑われる場合でも、個人情報を守るため市町村への通報はしない。

問題 116 成年後見制度について、正しいものの組合せを一つ選べ。

- a 認知症や精神障害などで、判断能力が不十分な人の権利を保護し、支援する制度である。
- b 成年後見人は、被後見人の財産管理に関する法的代理行為はできない。
- c 任意後見人は、被後見人の家族や親族が後見人を選ぶ制度である。
- d 法定後見制度は、本人の判断能力の程度により、後見、保佐および補助に区分される。

1 a、b 2 a、d 3 b、c 4 c、d

問題 117 高齢者の疾患の特徴について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 慢性化しやすい。
- 2 意識障害をおこしやすい。
- 3 薬物の有害作用（副作用）が出現しやすい。
- 4 症状や経過が定型的である。

問題 118 コーンンの理論による高齢者の障害受容過程について、正しいものを一つ選べ。

- 1 ショック → 悲嘆 → 防衛 → 回復への期待 → 適応
- 2 ショック → 悲嘆 → 防衛 → 適応 → 回復への期待
- 3 ショック → 回復への期待 → 悲嘆 → 防衛 → 適応
- 4 ショック → 防衛 → 悲嘆 → 適応 → 回復への期待

問題 119 災害時における高齢者について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 身体機能の低下により、危険回避行動が遅れやすい。
- 2 聴力の低下により、避難勧告や避難指示を告げる防災無線などを聞き逃す恐れがある。
- 3 避難所では食事が支給され、バランスの良い食事が摂れる。
- 4 避難所では、トイレに行く回数を減らすため、水分摂取を控えることにより、脱水状態や尿路感染をおこしやすい。

問題 120 検査を受ける高齢者の看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 禁飲食が必要な検査の場合でも、口渇の訴えがあれば飲水させる。
- 2 検査前のオリエンテーションは、口頭のみで行う。
- 3 医療従事者のペースで検査をすすめる。
- 4 検査中は転倒・転落に注意する。

問題 121 薬物療法を受ける高齢者の看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 複数の錠剤がある場合は、一度にまとめて服用するよう説明する。
- 2 同じ薬を長期間服用している場合は、副作用の観察はしない。
- 3 口腔内に薬が残りやすいので、服薬後は頻回に飲水するよう説明する。
- 4 飲み忘れた分は、次回の服用時間に、忘れた分を合わせて飲むように説明する。

問題 122 高齢者の感覚機能について、正しいものを一つ選べ。

- 1 低音域が聞き取りにくい。
- 2 老人性白内障は水晶体の弾力性の低下によっておこる。
- 3 明暗順応は低下する。
- 4 老人性難聴は伝音性難聴である。

問題 123 高齢者の角化型疥癬(ノルウェー疥癬)と看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 感染経路は、空気感染である。
- 2 約2週間の潜伏期間を経て発症する。
- 3 援助時は、予防衣やディスポーザブル手袋を着用する。
- 4 個室隔離はしない。

問題 124 高齢者のパーキンソン病の看護について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 抗パーキンソン薬の服用中は、ウェアリング・オフ現象に注意する。
- 2 小刻み歩行や前方突進現象による転倒を予防する。
- 3 排便状態を確認し、便秘を予防する。
- 4 ホーン・ヤール分類のステージIVでは全面介助を行う。

問題 125 高齢者の骨粗鬆症について、正しいものの組合せを一つ選べ。

- a ビタミンDの欠乏は骨量減少に影響する。
- b 転倒による骨折の発症は少ない。
- c 運動を頻回にすることで発症する。
- d 続発性骨粗鬆症は、内分泌性疾患や栄養障害によって発症する。

- 1 a、b 2 a、d 3 b、c 4 c、d

問題 126 認知症状を呈する疾患について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 クロイツフェルト - ヤコブ病 (プリオン病)
- 2 甲状腺機能亢進症
- 3 慢性硬膜下血腫
- 4 多発性硬化症

問題 127 妊娠による母体の変化について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 頻尿になりやすい。
- 2 下痢になりやすい。
- 3 腹部や大腿部に妊娠線が現れる。
- 4 顔面に、そばかす様の色素沈着（妊娠性肝斑）が現れることがある。

問題 128 妊娠期の葉酸の付加量について、正しいものを一つ選べ。

- 1 120 μ g
- 2 180 μ g
- 3 240 μ g
- 4 300 μ g

問題 129 分娩の3要素を構成するものについて、誤っているものを一つ選べ。

- 1 子宮底
- 2 骨産道
- 3 胎児
- 4 陣痛

問題 130 産褥体操の効果について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 排泄障害を予防する。
- 2 子宮収縮を促す。
- 3 静脈瘤の形成を予防する。
- 4 愛着形成が促進する。

問題 131 常位胎盤早期剝離の特徴について、正しいものを一つ選べ。

- 1 子宮内出血がある。
- 2 一絨毛膜二羊膜双胎のことが多い。
- 3 胎盤が内子宮口を覆っている。
- 4 下腹部痛は少ない。

問題 132 母子保健統計の用語の説明について、正しいものを一つ選べ。

- 1 妊産婦死亡とは、妊娠中または分娩後 28 日未満の女性の死亡のことである。
- 2 新生児死亡とは、生後 14 日未満の死亡である。
- 3 周産期死亡とは、妊娠 28 週以後の死産と早期新生児死亡をあわせたものである。
- 4 合計特殊出生率とは、1 人の女性が生涯に何人子どもを産むのかを推計したものである。

問題 133 歯の成長について、正しいものを一つ選べ。

- 1 乳歯は上顎の中切歯から生えはじめる。
- 2 2 歳から 2 歳 6 か月頃までに、20 本の乳歯が生えそろう。
- 3 永久歯は 8 歳頃に生えはじめる。
- 4 第 3 大臼歯は、30 歳を過ぎて生えることが多い。

問題 134 小児の与薬および注射について、正しいものを一つ選べ。

- 1 筋肉内注射は、大腿部内側広筋に実施する。
- 2 皮下注射は、ツベルクリン反応検査の時に用いられる。
- 3 坐薬は、肛門部が損傷している場合に用いる。
- 4 水薬は、良く振って混和し、必要量を薬杯やスポイトなどに準備する。

問題 135 ウイルス性肝炎について、正しいものを一つ選べ。

- 1 肝炎ウイルスにはA～Fの6つの型がある。
- 2 A型肝炎は、血液感染が主である。
- 3 B型肝炎は、母子感染防止対策が行われている。
- 4 C型肝炎からの肝がんの発症はみられない。

問題 136 小児の急性糸球体腎炎について、正しいものを一つ選べ。

- 1 先行感染として、溶血性レンサ球菌感染症が多い。
- 2 主な症状は、下痢や腹痛である。
- 3 乳児期に発症しやすい。
- 4 急性期には、高タンパクの食事が必要である。

問題 137 小児の血友病について、正しいものを一つ選べ。

- 1 血液凝固第Ⅷ因子の欠乏を血友病Bという。
- 2 女児に多く発生する。
- 3 体表面の出血が多い。
- 4 出血性関節症（関節内出血）の予防には、定期補充療法がある。

問題 138 アデノウイルスが原因となる疾患について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 咽頭結膜熱
- 2 流行性角結膜炎
- 3 出血性膀胱炎
- 4 手足口病

問題 139 発達段階とその年代の特徴の組合せで、正しいものを一つ選べ。

- | | | | |
|---|---------|---|-----------|
| 1 | 学童（児童）期 | — | ピーターパン症候群 |
| 2 | 青年期 | — | モラトリアム |
| 3 | 成人期 | — | 第二反抗期 |
| 4 | 老年期 | — | 空の巣症候群 |

問題 140 心の健康や問題について、正しいものを一つ選べ。

- 1 ワーカホリックにより、家庭崩壊に陥ることはない。
- 2 マタニティブルーは、妊娠初期段階にみられる。
- 3 バーンアウトは、燃えつきたように、突然無気力状態に陥る。
- 4 神経性無食欲症は、中年期の女性に多くみられる。

問題 141 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（精神保健福祉法）に規定されている内容について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 医療保護入院
- 2 精神障害者保健福祉手帳
- 3 精神保健指定医
- 4 包括型地域生活支援（ACT）

問題 142 精神科病棟に入院中の患者の処遇について、正しいものを一つ選べ。

- 1 患者が自ら希望して閉鎖環境の部屋（保護室）に入室することは、隔離に該当する。
- 2 任意入院患者は、原則として開放処遇する。
- 3 信書の発信受信は、原則として制限される。
- 4 保護者との面会は、原則として病院職員が立ち会う。

問題 143 知覚の障害について、正しいものを一つ選べ。

- 1 思考化声
- 2 強迫観念
- 3 させられ体験
- 4 感情鈍麻

問題 144 次の組合せで、正しいものを一つ選べ。

- | | | | |
|---|----------|---|----------|
| 1 | 電気けいれん療法 | — | アルコール依存症 |
| 2 | 認知療法 | — | 認知症 |
| 3 | 光（刺激）療法 | — | うつ病 |
| 4 | 森田療法 | — | 統合失調症 |

問題 145 悪性症候群について、正しいものを一つ選べ。

- 1 体温の低下
- 2 無汗
- 3 徐脈
- 4 血清クレアチンキナーゼ（CPK、CK）の著しい高値

問題 146 認知症について、正しいものを一つ選べ。

- 1 認知機能が低下しても、感情やプライドは残存している。
- 2 病態（原因）別では、脳血管性認知症が最も多い。
- 3 アルツハイマー病では、まだら認知症がみられる。
- 4 アルツハイマー病には、薬物療法は効果がない。

問題 147 精神疾患治療中の看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 精神療法中は、治療的な援助を継続するため、カンファレンスは行わない。
- 2 社会生活技能訓練（SST）の目的は、患者自身が精神問題について自己洞察することである。
- 3 薬物療法では、患者自身が服薬を中断せず、継続できるように援助する。
- 4 身体的拘束は、短時間であれば看護者の判断でできる。

問題 148 精神科入院患者の看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 入院中の患者の家族に対して、精神的な支えになるようにする。
- 2 入院中は、積極的に代理行為をおこなうようにする。
- 3 退院に向けては、医師と看護師だけで支援する方が効果的である。
- 4 入院時のオリエンテーションは、省略してもよい。

問題 149 不安状態にある患者の看護について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 不安の反応には、情緒的反応、行動上の反応、生理的反応がある。
- 2 不安をあらわす反応の有無や程度を観察する。
- 3 患者の不安や心配には、真剣な態度で接する。
- 4 患者の不安に対する思いや反応は、代弁しない。

問題 150 次のうち、正しいものを一つ選べ。

- 1 拒絶状態にある患者に対し、治療には患者自身の協力が必要であることを理解してもらう。
- 2 アルコール依存症の回復には、自助グループへの参加は効果がない。
- 3 認知症は、高齢者だけに発症する疾患である。
- 4 統合失調症の発症のピークは、成人期後期である。

