

令和元年度

関西広域連合 准看護師試験問題

注 意 事 項

試験開始の指示があるまで、試験問題を開かないでください。

- 1 試験問題は150問あります。試験時間は2時間30分です。
- 2 解答用紙（マークシート）に記入されている受験番号が受験票記載の受験番号と一致しているかを確認し、一致していれば解答用紙に氏名、フリガナを正確に記入してください。
- 3 解答は四肢択一となっています。必ず解答用紙に1つだけマークしてください。2つ以上マークすると、その解答は無効になります。
- 4 記入はHBの黒鉛筆又はシャープペンシルを使用し、解答用紙の記載例（「マークの仕方」の良い例）のとおり、濃くはっきりと記入してください。
- 5 解答用紙に誤ってマークしたときは、消しゴムできれいに消してください。
- 6 解答用紙は、汚したり折り曲げたりしないでください。
- 7 解答用紙は、持ち帰らずに必ず提出してください。
- 8 試験開始から1時間は退室できません。1時間が経過した後に退室する方は、解答用紙の氏名と受験番号を再度確認の上、試験監督者に提出し、静かに退室してください。一度退室すると再入室はできません。
- 9 試験終了前10分間は退室できません。
- 10 受験票と試験問題は、持ち帰ってください。

試験会場では静粛にし、試験監督者の指示に従ってください。
不正行為や試験監督者の指示に従わないときは、退場を命じ、試験を無効とする場合があります。

#####

問題 1 ヒトの染色体について、正しいものを一つ選べ。

- 1 染色体数は精子より卵子が多い。
- 2 Y染色体は女性決定因子である。
- 3 44本の常染色体と2本の性染色体がある。
- 4 染色体の中にはトランスファーRNAが含まれている。

問題 2 交感神経の働きについて、誤っているものを一つ選べ。

- 1 末梢血管の収縮
- 2 瞳孔の縮小(縮瞳)
- 3 消化管の運動抑制
- 4 気管支の弛緩

問題 3 腎・泌尿器系について、正しいものを一つ選べ。

- 1 腎臓はプロゲステロンを産生する。
- 2 尿管の生理的狭窄部位は、2か所である。
- 3 女性の尿道は7~8cmである。
- 4 原尿は尿細管で再吸収される。

問題 4 ホルモンとその作用の組合せで、正しいものを一つ選べ。

- 1 甲状腺ホルモン — 基礎代謝抑制
- 2 インスリン — グリコーゲンの分解促進
- 3 バソプレシン — 抗利尿作用
- 4 オキシトシン — 子宮筋弛緩

問題 5 神経系について、正しいものを一つ選べ。

- 1 脊髄神経のうち腰神経は4対である。
- 2 視床下部は、下垂体から分泌されるホルモンの調節を行う。
- 3 言語の中樞は、大脳の右半球に存在することが多い。
- 4 顔面神経は眼球を動かす神経である。

問題 6 消化器系について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 喉頭蓋^{こうとうがい}は食物を飲み込む際に、ふたをする役目をする。
- 2 歯の表層は、象牙質で覆われている。
- 3 胃腺の壁細胞は、塩酸を分泌する。
- 4 食道の粘膜は、重層扁平上皮である。

問題 7 人体の発生と女性の生理機能について、正しいものを一つ選べ。

- 1 卵胞が破裂し、卵子が排出されることを着床という。
- 2 外胚葉は、骨、筋および血管系の粘膜上皮になる。
- 3 内胚葉は、呼吸器系や消化器系の粘膜上皮になる。
- 4 母体のプロゲステロンは、新生児による乳首の吸啜^{きゅうてつ}刺激で分泌される。

問題 8 呼吸器系について、正しいものを一つ選べ。

- 1 右気管支は、左気管支よりも細く長い。
- 2 左肺は、第4肋骨に沿う水平裂によって分けられる。
- 3 肺胞は、毛細血管が密に分布し弾性に富む。
- 4 胸膜腔には少量の血液が認められる。

問題 9 循環器系について、正しいものを一つ選べ。

- 1 心臓壁は、クモ膜と心筋層からなる。
- 2 冠状静脈洞は左心房に開口する。
- 3 肺動脈は右心室から出る。
- 4 肺動脈血は、酸素を豊富に含んだ血液である。

問題 10 18～29 歳男性の食事摂取基準(日本人の食事摂取基準、2015 年版)について、正しいものを一つ選べ。

- 1 身体活動レベルⅡ(ふつう)の推定エネルギー必要量は 3,300kcal/日である。
- 2 目標とするBMIは 18.5～24.9 である。
- 3 タンパク質の推奨量は 120g/日である。
- 4 ナトリウム(食塩相当量)の目標量は 12.0g/日未満である。

問題 11 脂質について、正しいものを一つ選べ。

- 1 脂質は、代謝される過程でビタミンB₁を必要とする。
- 2 リノール酸と α -リノレン酸は、体内で合成される。
- 3 脂質は、ビタミンAやビタミンDの吸収を助長する。
- 4 飽和脂肪酸は、動脈硬化を改善する。

問題 12 体液について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 カリウムは、細胞内で体液浸透圧の維持(保持)に関与する。
- 2 鉄は、酸塩基平衡に関与する。
- 3 カルシウムは、血液の凝固に関与する。
- 4 成人の1日の不感蒸泄は、およそ 900mL である。

問題 13 薬の説明について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 抗インフルエンザウイルス薬は、発症から 48 時間以内に使用する。
- 2 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)内服時は、消化性潰瘍に注意する。
- 3 ヘリコバクター・ピロリ菌による胃・十二指腸潰瘍には、除菌治療が有効である。
- 4 塩類下剤は、小腸粘膜を直接刺激し、蠕動運動を亢進させ、排便を促す。

問題 14 自律神経作用薬について、正しいものを一つ選べ。

- 1 アドレナリンは、急性心不全時には使用しない。
- 2 ドパミンは、腎臓の血流量を増加させる。
- 3 ネオスチグミンは、麻酔の前投薬として使用される。
- 4 アトロピンは、瞳孔を収縮させる作用がある。

問題 15 抗菌薬について、正しいものを一つ選べ。

- 1 合成抗菌薬とは、微生物によって産生され、他の微生物の発育を抑える物質である。
- 2 抗菌スペクトルとは、抗菌薬の分類である。
- 3 バンコマイシンは、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)に対し、抗菌力がある。
- 4 ペニシリンは結核菌に対し、すぐれた抗菌力がある。

問題 16 悪性腫瘍について、正しいものを一つ選べ。

- 1 周囲の臓器に浸潤しない。
- 2 腫瘍細胞の異型度が高い。
- 3 離れた臓器に転移しない。
- 4 上皮性の悪性腫瘍を肉腫という。

問題 17 浮腫をおこす主な原因について、正しいものを一つ選べ。

- 1 貧血
- 2 うっ血
- 3 虚血
- 4 出血

問題 18 再生能力が高い細胞について、正しいものの組合せを一つ選べ。

- a 皮膚の表皮細胞
- b 心筋細胞
- c 中枢神経細胞
- d 肝細胞

- 1 a、b 2 a、d 3 b、c 4 c、d

問題 19 脳内出血の出血部位について、正しいものを一つ選べ。

- 1 頭蓋骨と硬膜の間
- 2 硬膜とクモ膜の間
- 3 クモ膜と脳実質の間
- 4 脳実質内

問題 20 ビタミンB₁₂や葉酸の不足による貧血について、正しいものを一つ選べ。

- 1 鉄欠乏性貧血
- 2 巨赤芽球性貧血
- 3 再生不良性貧血
- 4 溶血性貧血

問題 21 冠状動脈の閉塞により心筋が壊死した状態について、正しいものを一つ選べ。

- 1 心筋症
- 2 狭心症
- 3 心筋梗塞
- 4 心臓弁膜症

問題 22 病原微生物と感染経路の組合せで、正しいものを一つ選べ。

- 1 A型肝炎ウイルス — 経口感染
- 2 腸管出血性大腸菌 — 飛沫感染
- 3 ムンプスウイルス — 空気感染(飛沫核感染)
- 4 ヒト免疫不全ウイルス(H I V) — 昆虫媒介感染

問題 23 予防接種法に基づき予防接種が行われる感染症について、正しいものの組合せを一つ選べ。

- a 水痘
- b 風疹
- c 後天性免疫不全症候群(A I D S)
- d C型肝炎

- 1 a、b 2 a、d 3 b、c 4 c、d

問題 24 疾患とウイルスの組合せで、誤っているものを一つ選べ。

- 1 咽頭結膜熱 — アデノウイルス
- 2 流行性耳下腺炎 — ノロウイルス
- 3 急性灰白髄炎 — ポリオウイルス
- 4 手足口病 — コクサッキーウイルス

問題 25 ビーチャムとチルドレスの示した医療の 4 つの倫理原則について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 自律尊重
- 2 忠誠
- 3 善行
- 4 正義

問題 26 看護者の倫理綱領(日本看護協会、2003 年)について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 対象となる人々に平等の看護を提供する。
- 2 対象となる人々との間に信頼関係を築き、その信頼関係に基づいて看護を提供する。
- 3 守秘義務は、いかなる場合も^{じゅんしゆ}遵守し情報の共有は行うべきではない。
- 4 実施した看護については、個人としての責任をもつ。

問題 27 ストレッサーの種類と原因の組合せで、正しいものを一つ選べ。

- 1 物理的ストレス — 細菌
- 2 生物的ストレス — ライフイベント
- 3 化学的ストレス — 薬物
- 4 精神的(心理・社会的)ストレス — 騒音

問題 28 成人期・老年期の心理的变化について、正しいものを一つ選べ。

- 1 子どもが独立し、子育ての役割を失ったことにより出現するのは、燃え尽き症候群である。
- 2 長年続けてきた仕事から離れ、ホッとしたときにおこる鬱^{うつ}状態は、空の巣症候群である。
- 3 老年期では、喪失感や孤独感を抱え、自尊心が低下しやすい。
- 4 老年期では死は身近なものとなるため、死を受け入れることが容易となる。

問題 29 問題焦点型コーピングについて、正しいものの組合せを一つ選べ。

- a 問題に対して情報収集を行う。
- b 人に悩みを話して心を静める。
- c 問題について考えるのをやめる。
- d 問題を解決するための計画を立てる。

- 1 a、b 2 a、d 3 b、c 4 c、d

問題 30 医療保険はどれか、正しいものを一つ選べ。

- 1 年金保険
- 2 雇用保険
- 3 厚生年金保険
- 4 国民健康保険

問題 31 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)について、正しいものを一つ選べ。

- 1 障害者の範囲には、難病患者は含まれない。
- 2 対象年齢は20歳以上である。
- 3 利用可能なサービスには、「自立支援給付」と「地域生活支援事業」がある。
- 4 障害者手帳の交付について規定されている。

問題 32 保健師助産師看護師法に規定する免許にかかる欠格事由について、正しいものを一つ選べ。

- 1 絶対的欠格事由と相対的欠格事由がある。
- 2 難聴で日常的に補聴器を使用している者には、免許は与えられない。
- 3 麻薬、大麻又はあへん中毒者は、欠格事由にあたる。
- 4 免許を有する者には適用しない。

問題 33 准看護師の職務上の義務について、正しいものの組合せを一つ選べ。

- a 業務従事者届
- b 守秘義務
- c 処方箋交付義務
- d 応招義務

- 1 a、b 2 a、d 3 b、c 4 c、d

問題 34 国際生活機能分類（ICF）について、正しいものの組合せを一つ選べ。

- a 健康と障害は、相対するものであるという考えに基づいている。
- b 生活機能の分類は、心身機能・身体構造、活動および参加である。
- c WHOは、2001年に国際障害分類を国際生活機能分類へと改めた。
- d 環境因子には、年齢、性別およびライフスタイルがある。

1 a、b 2 a、d 3 b、c 4 c、d

問題 35 ハヴィガーストによる各期の発達課題の組合せで、正しいものを一つ選べ。

- 1 児童期(学童期) — 善悪の区別を学ぶ
- 2 青年期 — 大人の余暇活動の充実
- 3 中年期(成人中期) — 社会的に責任のある行動への努力
- 4 老年期(高齢期) — 肉体(身体)的变化への適応

問題 36 看護理論家とその著書の組合せで、正しいものを一つ選べ。

- 1 H. E. ペプロウ — 看護の探求
- 2 V. ヘンダーソン — 臨床看護の本質
- 3 J. トラベルビー — 人間対人間の看護
- 4 D. E. オレム — 看護の基本となるもの

問題 37 医療安全について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 作業の中断は、ヒューマンエラーを誘発する。
- 2 作業の分担は、ヒューマンエラーを防ぐ。
- 3 リストバンドやバーコードの利用は、患者の誤認防止に役立つ。
- 4 患者の転倒・転落アセスメントスコアシートの活用は、事故防止に役立つ。

問題 38 「看護は、人間が持っている生命力の消耗を最小にし、自然治癒力が最もはたらきやすいように、患者を取り巻く環境や生活を整えること」と定義した理論家について、正しいものを一つ選べ。

- 1 P. ベナー
- 2 V. ヘンダーソン
- 3 F. ナイチンゲール
- 4 S. C. ロイ

問題 39 看護におけるコミュニケーションについて、正しいものを一つ選べ。

- 1 文字盤の使用は、言語的コミュニケーションである。
- 2 聴力障害のある患者には、後方から声をかける。
- 3 呼吸困難のある患者への質問は、開かれた質問が適している。
- 4 面談や会話の際、患者の緊張を和らげるためには、患者の正面に座る。

問題 40 医療事故防止について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 患者誤認を防ぐため、患者に氏名を名乗ってもらう。
- 2 ヒヤリ・ハットは、インシデントレポートとして報告する。
- 3 誤薬防止のための4つのR (Right)の確認が推奨されている。
- 4 ベッド柵を用いる時は、患者・家族への説明を行い、同意を得る。

問題 41 看護者のボディメカニクスについて、正しいものを一つ選べ。

- 1 足と床の間の摩擦力を大きくする。
- 2 足を閉じた姿勢にする。
- 3 重心の位置を高くする。
- 4 重心線を支持基底面の中心から離す。

問題 42 観察の方法と得られる情報の組合せで、誤っているものを一つ選べ。

- 1 視診 ー 表情、排泄物、分泌物
- 2 聴診 ー 呼吸音、腸蠕動音
- 3 触診 ー 呼吸臭、分泌物のにおい
- 4 打診 ー 空気やガスの貯留音

問題 43 触診法による血圧測定について、正しいものを一つ選べ。

- 1 マンシエットの下角が肘窩部にあたるように巻く。
- 2 マンシエットを巻いた腕は、心臓より低い位置に置く。
- 3 触診で脈拍が触れなくなった後、40～50 mm Hg 加圧する。
- 4 減圧開始後、脈拍が触れはじめた目盛りが収縮期血圧値である。

問題 44 看護における適切な報告について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 報告したい内容を整理し、要点をまとめる。
- 2 先に経過と理由を述べてから、次に結論を述べる。
- 3 急変時の報告は、一刻も早く行う。
- 4 重要な報告は口頭で行い、記録でも行う。

問題 45 看護記録について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 フォーカスチャータニング方式の記録では、“D” が実施した看護ケアである。
- 2 POSでは、SOAPの“O” が客観的情報である。
- 3 専門用語は、正しく用いて記録する。
- 4 患者・家族への説明や、やりとりの内容を記録する。

問題 46 仰臥位にある患者の良肢位について、正しいものを一つ選べ。

- 1 手関節は 45 度背屈とする。
- 2 肘関節は 45 度屈曲とする。
- 3 足関節は背屈・底屈 0 度とする。
- 4 膝関節は 90 度屈曲とする。

問題 47 身体測定の方法について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 身長測定は、眼窩下縁と外耳孔上縁が水平となるようにする。
- 2 体重計は、測定する前に指針が 0 点になっていることを確認する。
- 3 女性の胸囲測定は、巻き尺を乳頭の位置にあて測定する。
- 4 仰臥位での腹囲測定は、両膝を伸展させ、臍の位置で床面と垂直に腹周囲を測定する。

問題 48 手指衛生(衛生的手洗い)について、正しいものを一つ選べ。

- 1 石けんと流水による洗浄の全行程は、30～60 秒かけて行う。
- 2 手首を最初に洗う。
- 3 洗浄後は、布タオルで水分をふき取る。
- 4 手指衛生は、「二行為一手洗い」が原則である。

問題 49 ストレッチャー(輸送車)移送について、正しいものを一つ選べ。

- 1 拘束となるので、ストレッチャーの柵は使用しない。
- 2 斜面を上がるときは、患者の足を前にして進む。
- 3 平坦なところは、患者の頭を前にして進む。
- 4 移送の速度は、ゆっくり歩く程度とする。

問題 50 睡眠への援助について、正しいものを一つ選べ。

- 1 日中に適度な疲労感が得られる身体活動を取り入れる。
- 2 空腹感で寝つけないときは、満腹になるような食事をすすめる。
- 3 足浴は、深部体温を上昇させるので睡眠前には行わない。
- 4 光刺激(明かり)は、鎮静作用があり寝つきをよくする。

問題 51 右片麻痺患者の病衣の交換について、正しいものを一つ選べ。

- 1 右から脱がせ、右から着せる。
- 2 右から脱がせ、左から着せる。
- 3 左から脱がせ、右から着せる。
- 4 左から脱がせ、左から着せる。

問題 52 洗髪の援助について、正しいものを一つ選べ。

- 1 洗髪前の頭髪のブラッシングは必要ない。
- 2 頭皮には、43～45℃の湯をかける。
- 3 患者の頭髪に直接シャンプーをつけて泡立てる。
- 4 頭皮は、指の腹を使って洗う。

問題 53 自分で食べられない臥床患者の食事介助について、正しいものを一つ選べ。

- 1 食膳は、看護者が見わたせる場所に置く。
- 2 吸いのみを用いる場合は、患者の正面から口に入れる。
- 3 スプーンにのせた食物を上顎や上歯列弓にすりつけて口腔内におく。
- 4 食後 30～60 分程度は、上半身を挙上した体位とする。

問題 54 床上排泄時の援助について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 男性が便意を訴えた場合は、尿器も準備する。
- 2 便器は体温程度に温めるか、便器用パッドを取り付ける。
- 3 便器内に、トイレットペーパーを敷く。
- 4 排便処理に使用した手袋は、患者の寝衣を整えた後に外す。

問題 55 成人の経鼻栄養チューブの挿入について、正しいものを一つ選べ。

- 1 挿入時の体位は、枕を外した仰臥位とする。
- 2 管が咽頭に達したら、頸部を後屈させる。
- 3 嚥下運動よりも、はやい速度で管を挿入する。
- 4 空気を注入して胃部の気泡音を聴診し、管が胃内に到達したことを確認する。

問題 56 グリセリン浣腸の目的について、正しいものを一つ選べ。

- 1 腸の狭窄や通過障害などの検査
- 2 ガスによる腹部の膨満感の緩和
- 3 腸内の洗浄
- 4 便の軟化による排便促進

問題 57 褥瘡の予防について、正しいものを一つ選べ。

- 1 エアマットレスの使用時は、時間ごとの体位変換は不要である。
- 2 局所の圧迫を避けるため、円座を使用する。
- 3 皮膚のバリア機能を強化するため、水分は残して清拭する。
- 4 座位の場合、ずれの力が発生しないよう、大腿後面で体重を支えられるようにする。

問題 58 成人の持続的導尿について、正しいものを一つ選べ。

- 1 目的の一つに、泌尿器の手術後の局所安静がある。
- 2 カテーテルのサイズは、20Fr 以上を用いる。
- 3 消毒した物品を用いる。
- 4 挿入するカテーテルの長さは、尿道の長さと同じとする。

問題 59 腹部の内科診察時の体位について、正しいものを一つ選べ。

- 1 碎石位
- 2 仰臥位
- 3 半座位
- 4 膝胸位

問題 60 温罨法の作用について、正しいものの組合せを一つ選べ。

- a 副交感神経を活発にする。
- b 痛覚神経の興奮を鎮静する。
- c 局所の血管が収縮する。
- d 急性炎症の症状を緩和する。

- 1 a、b 2 a、d 3 b、c 4 c、d

問題 61 成人の気管内吸引について、正しいものを一つ選べ。

- 1 15Fr のカテーテルを使用する。
- 2 吸引圧は 27kPa とする。
- 3 吸引の陰圧をかける時間は、1 回あたり 10 秒以内とする。
- 4 使用したカテーテルは、水道水で洗浄して再使用する。

問題 62 成人患者への薬剤の投与方法について、正しいものの組合せを一つ選べ。

- a 筋肉内注射は大殿筋に行う。
- b 皮下注射は前腕内側に行う。
- c 点眼薬は下結膜囊^{のう}に滴下する。
- d 食間薬は、食後 2～3 時間経過後に服用する。

1 a、b 2 a、d 3 b、c 4 c、d

問題 63 吸入について、正しいものを一つ選べ。

- 1 噴霧吸入は、気道内の加湿、消炎、去痰および排痰を目的に実施する。
- 2 酸素吸入時の酸素濃度は、看護職が患者の状態に応じて調整する。
- 3 ボール型の酸素流量計は、ボールの上縁に目の高さを合わせて目盛を読む。
- 4 ジェットネブライザーは、薬液を 0.5～5 μm の粒子にして肺胞まで到達させる。

問題 64 包帯法とその目的の組合せで、正しいものを一つ選べ。

- 1 圧迫 — 骨折の整復
- 2 牽引 — 修復した関節の固定
- 3 被覆 — 創傷を覆^{おお}い保護
- 4 支持 — 浮腫の軽減

問題 65 成人の採血について、適切な部位の組合せを一つ選べ。

- a 肘正中皮静脈
- b 橈側皮静脈
- c 大伏在静脈
- d 鎖骨下静脈

1 a、b 2 a、d 3 b、c 4 c、d

問題 66 看取りの援助について、正しいものを一つ選べ。

- 1 患者の生前から、グリーフケアとしての支援を行う。
- 2 臨死期の身体的変化では、循環機能の亢進がみられる。
- 3 死後の処置は、故人の尊厳に配慮しマスク、手袋及びガウンの着用はしない。
- 4 死後のケアを行ったあとで、家族が故人とのお別れの時間をもつことができるようにする。

問題 67 急性期にある患者の看護について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 全身状態を観察し、重症度や緊急度を判断する。
- 2 関節の拘縮予防のために他動運動を行う。
- 3 生命を維持し、症状を緩和し、基本的ニーズの充足を図る。
- 4 患者の動揺を増強させるので、処置の説明はしない。

問題 68 貧血のある患者の看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 ビタミンの摂取を控える。
- 2 迅速な動作を促す。
- 3 全身の皮膚や粘膜の清潔を保つ。
- 4 鉄剤内服時は、呼吸器症状の出現に注意する。

問題 69 1日の尿量が100mL以下の状態について、正しいものを一つ選べ。

- 1 無尿
- 2 乏尿
- 3 多尿
- 4 尿閉

問題 70 しびれのある患者の看護について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 皮膚の刺激になるため、マッサージはしない。
- 2 転倒予防のため、周囲の障害物を取り除く。
- 3 やわらかい素材で圧迫しない衣服を選択する。
- 4 精神的苦痛の緩和を図るため、気分転換の方法を患者とともに見つける。

問題 71 安静療法の効果を高めるための援助について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 安静の必要性の理解と納得への援助
- 2 日常生活動作への援助
- 3 社会的役割の遂行への援助
- 4 医療者に対する全面的依存への援助

問題 72 徒手筋力テスト(MMT)で「重力を除けば全可動域を完全に動かせる。」とする評価はどれか、正しいものを一つ選べ。

- 1 0
- 2 2
- 3 4
- 4 5

問題 73 放射線療法に伴う晩発性障害について、正しいものの組合せを一つ選べ。

- a 消化管潰瘍
- b 放射線宿酔
- c 血小板の減少
- d 骨壊死

- 1 a、b 2 a、d 3 b、c 4 c、d

問題 74 検査を受ける患者の看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 医師からの検査の説明時には、看護職は席を外す。
- 2 食事制限や薬剤の服用中止の指示を確認する。
- 3 検体の取扱いは、標準予防策(スタンダードプリコーション)の対象外である。
- 4 検査結果に異常がない場合は、看護職から説明する。

問題 75 透析療法を受ける患者の看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 血液透析の場合は、シャント部の拍動を確認する。
- 2 血液透析中の頭痛や吐き気は、よくある症状なので心配しなくてもよいことを説明する。
- 3 腹膜透析は、週に3回程度行うよう、説明する。
- 4 腹膜透析は、医療機関で行うよう、説明する。

問題 76 脊髄クモ膜下麻酔を受ける患者の看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 第1~2 腰椎間腔が十分開くよう患者の姿勢を整える。
- 2 麻酔で痛覚は消失するが、触覚は残ることがあると説明する。
- 3 麻酔中は、血圧上昇をおこしやすい。
- 4 低比重の局所麻酔薬が使用される場合は、手術部位が下になる体位をとらせる。

問題 77 喫煙が関連する疾患について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 食道がん
- 2 慢性閉塞性肺疾患
- 3 1型糖尿病
- 4 心筋梗塞

問題 78 がんの一次予防について、正しいものを一つ選べ。

- 1 がん検診を受ける。
- 2 生活習慣を見直し、適度な運動を取り入れる。
- 3 何か症状を自覚したらすぐに受診する。
- 4 がん治療後、再発予防に取り組む。

問題 79 40 歳代の死因順位(人口動態調査、平成 28 年)の第 2 位を選べ。

- 1 心疾患
- 2 脳血管疾患
- 3 悪性新生物
- 4 自殺

問題 80 修正MRCスケール(MRC息切れスケール)のグレード 3 について、正しいものを一つ選べ。

- 1 息切れのため、同年代の人よりも平坦な道を歩くのが遅い。
- 2 平坦な道を約 100m 歩くと、息切れのために立ち止まる。
- 3 息切れのために家から出られない。
- 4 ゆるやかな上り坂を歩くときに息切れがある。

問題 81 がいそう かくたん 咳嗽と喀痰が続いている患者の看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 部屋の湿度を低めに調整する。
- 2 呼吸困難を伴う場合は、起座位や半座位をとらせる。
- 3 水分の摂取を控えさせる。
- 4 分泌物の貯留した肺区域を下側にして排痰を促す。

問題 82 胸腔ドレナージを受ける患者の看護について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 胸腔内に貯留した液体や気体を体外に排出し、肺の再膨張を促す。
- 2 エアリークの有無を観察する。
- 3 ドレイン挿入部・接続部は無菌操作で処置をする。
- 4 ドレインが閉塞している場合は、水封室で呼吸性移動がみられる。

問題 83 吐血・下血について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 吐血は、トライツ靭帯より口側の消化管からの出血でおこる。
- 2 吐血は、胃液が混じることで酸化され、黒色を呈する。
- 3 大腸下部からの多量の出血ではタール便がみられる。
- 4 吐血・下血時は、血圧の変動に注意する。

問題 84 上部消化管内視鏡検査を受ける患者の看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 検査当日の朝から絶食とする。
- 2 患者の体位は右側臥位とする。
- 3 咽頭部の局所麻酔を十分にするために、麻酔薬はしばらく喉の奥に保持するように説明する。
- 4 終了直後、悪心がなければ食事をすすめる。

問題 85 胃全摘術後のダンピング症候群の症状について、正しいものを一つ選べ。

- 1 発熱
- 2 動悸
- 3 つかえ感
- 4 胸やけ

問題 86 肝硬変患者の看護について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 代償性肝硬変症では黄疸が出現する。
- 2 門脈圧亢進症状の有無を観察する。
- 3 出血傾向があることを説明する。
- 4 腹水貯留時は、塩分を制限する。

問題 87 輸血療法を受ける患者の看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 溶血を防ぐため、血液製剤(血液バッグ)は混和しない。
- 2 輸血開始後5分間は、患者のそばで注意深い観察が必要である。
- 3 即時型副作用(急性症状)の出現時は、医師に報告した後に輸血を中止する。
- 4 副作用の予防として、抗菌薬を同時に点滴静脈注射する。

問題 88 経口血糖降下薬を服用する患者の看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 α -グルコシダーゼ阻害薬は、消化管でのブドウ糖の吸収を遅らせる作用があることを説明する。
- 2 内服治療では低血糖は起こらないことを説明する。
- 3 運動は、空腹時に行うよう説明する。
- 4 血糖値を安定させるため、間食をすすめる。

問題 89 痛風とその看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 乳酸の産生過剰や排泄低下により生じる。
- 2 好発部位は第五中足趾(第五中足指)節関節である。
- 3 緑黄色野菜の摂取を制限する。
- 4 発作時には消炎鎮痛薬を用いる。

問題 90 心原性ショック時の看護について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 呼吸管理
- 2 頭部挙上
- 3 血管確保
- 4 尿量の観察

問題 91 播種性血管内凝固症候群(D I C)の看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 清潔保持のため、積極的に入浴をすすめる。
- 2 皮下出血予防のため、出血時の圧迫止血は禁忌である。
- 3 脳内出血(脳出血)予防のため、排便コントロールを行う。
- 4 口腔粘膜からの出血を予防するため、口腔ケアは行わない。

問題 92 甲状腺摘出術後患者の看護について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 嗄声の有無を観察する。
- 2 呼吸困難の有無を観察する。
- 3 下顎を挙上し、頸部を伸展させた状態で安静にする。
- 4 手足のしびれや痙攣^{けいれん}の有無を観察する。

問題 93 溶血性貧血の原因について、正しいものを一つ選べ。

- 1 月経過多
- 2 自己抗体
- 3 胃全摘術
- 4 腎機能障害

問題 94 心不全患者の看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 動脈血の pHを上昇させるため、酸素を投与する。
- 2 運動耐容能を増加させるため、安静を保持する。
- 3 静脈血の還流を促進するため、ファウラー(ファーラー)位とする。
- 4 低ナトリウム血症を改善するため、水分制限を行う。

問題 95 心臓手術後の低心拍出量症候群の症状について、正しいものの組合せを一つ選べ。

- a 頻脈
- b 血圧低下
- c 高体温
- d 多尿

1 a、b 2 a、d 3 b、c 4 c、d

問題 96 脳血管造影検査を受ける患者の看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 検査前の飲食制限はない。
- 2 鼠径部の大腿静脈を穿刺して行われる。
- 3 検査後は穿刺部位の圧迫止血を行う。
- 4 検査直後より歩行は可能である。

問題 97 髄膜刺激症状について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 頭痛
- 2 項部硬直
- 3 嘔吐
- 4 発熱

問題 98 変形性膝関節症手術後の患者の看護について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 脛骨神経麻痺の予防に努める。
- 2 深部静脈血栓症の予防に努める。
- 3 筋力増強訓練の必要性を説明する。
- 4 退院後の患部の感染の危険性について説明する。

問題 99 疾患と治療法の組合せで、正しいものを一つ選べ。

- | | | | |
|---|-----------|---|-------------|
| 1 | 大腿骨大転子部骨折 | — | 人工骨頭置換術 |
| 2 | アキレス腱断裂 | — | 尖足位でのギプス固定 |
| 3 | 骨粗鬆症 | — | ビタミンAの投与 |
| 4 | 後縦靭帯骨化症 | — | 副甲状腺ホルモンの投与 |

問題 100 下肢の介達牽引患者の看護について、正しいものの組合せを一つ選べ。

- a 牽引による苦痛が強い場合は、重錘(おもり)を床につける。
- b 包帯は、1日1回巻きなおす。
- c 包帯は、腓骨小頭部を外して巻く。
- d 掛物は、牽引のひもの上に掛ける。

- 1 a、b 2 a、d 3 b、c 4 c、d

問題 101 経尿道的前立腺切除術を受ける患者の看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 前立腺がんに対する治療法である。
- 2 血尿は、手術直後からみられなくなる。
- 3 術後、尿閉時は導尿を実施する。
- 4 退院後は長時間の立位は避けるよう説明する。

問題 102 成人ネフローゼ症候群患者の看護について、正しいものの組合せを一つ選べ。

- a 軽度のタンパク尿と高タンパク血症がみられる。
- b 浮腫による苦痛を緩和し、皮膚を保護する。
- c 皮膚、口腔及び外陰部の清潔を保ち、感染を予防する。
- d 副腎皮質ステロイド薬による低血圧に注意する。

1 a、b 2 a、d 3 b、c 4 c、d

問題 103 尿路結石患者の看護について、正しいものの組合せを一つ選べ。

- a 側腹部から背部への疼痛の程度を観察する。
- b 顕微鏡的血尿はみられない。
- c 結石の排出を促すために安静にする。
- d 疝痛発作に対して鎮痛薬、鎮痙薬で対応する。

1 a、b 2 a、d 3 b、c 4 c、d

問題 104 子宮体がんについて、正しいものを一つ選べ。

- 1 好発年齢は、20～30歳である。
- 2 妊娠回数が多い人に好発する。
- 3 不正性器出血や帯下の増加が主な症状である。
- 4 治療の第一選択は化学療法である。

問題 105 乳房切除術後の患者の看護について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 腋窩のドレナージは、低圧持続吸引で行う。
- 2 仰臥位では、患側上肢を肩より低い位置になるよう固定する。
- 3 患側上肢で血圧測定や採血は行わない。
- 4 健側の乳房の自己検診を行うよう説明する。

問題 106 女性生殖器疾患で下腹部痛がある患者の看護について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 不正性器出血の有無を観察する。
- 2 月経や妊娠の有無を確認する。
- 3 痛みの部位に冷罨法を行う。
- 4 疼痛が緩和される体位を工夫する。

問題 107 I型アレルギー反応について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 アナフィラキシーショック
- 2 全身性エリテマトーデス(SLE)
- 3 蕁麻疹
- 4 気管支喘息

問題 108 メニエール病とその看護について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 浮動性のめまいをきたす。
- 2 感音性難聴をきたす。
- 3 めまい発作時は安静とする。
- 4 日常生活の中で転倒や転落に注意するよう説明する。

問題 109 網膜剥離について、正しいものを一つ選べ。

- 1 視力の低下はみられない。
- 2 前駆症状には飛蚊症がある。
- 3 近視眼との関連性はない。
- 4 眼圧上昇が持続する。

問題 110 皮膚疾患について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 単純ヘルペス(単純性疱疹)ウイルス I 型の感染では、下半身に症状が出現する。
- 2 カポジ水痘様発疹症は、単純ヘルペスウイルスと関連がある。
- 3 帯状疱疹は、神経節に潜伏感染したウイルスが再燃して発症する。
- 4 帯状疱疹は、治療後も神経痛が残る場合がある。

問題 111 歯・口腔疾患とその看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 エナメル上皮腫は、顎骨を破壊することはない。
- 2 抜歯当日の含嗽は、止血するまで頻回に行うように説明する。
- 3 開口障害がある場合は、口腔ケアを控える。
- 4 歯周炎は糖尿病との関連がある。

問題 112 ヒト免疫不全ウイルス(H I V)感染症とその看護について、正しいものの組合せを一つ選べ。

- a 感染直後から日和見感染を起こしやすくなる。
- b 傷のある患者の清拭は、手袋を装着して行う。
- c 本人を感染源としての個室隔離は必要ない。
- d C D 4 陽性 T 細胞が増加すると、後天性免疫不全症候群(A I D S)を発症する。

- 1 a、b 2 a、d 3 b、c 4 c、d

問題 113 高齢者を取り巻く社会と社会システムについて、正しいものを一つ選べ。

- 1 介護保険におけるサービスは、要介護認定の有無にかかわらず、65 歳以上であれば申請により受けることができる。
- 2 健康日本 21 (第二次) では、健康寿命の延伸が重視されている。
- 3 新オレンジプランでは、高齢者の自立支援(寝たきり老人ゼロ)を目標としている。
- 4 新ゴールドプランの目標には、若年性認知症施策の強化がある。

問題 114 地域包括ケアシステムについて、誤っているものを一つ選べ。

- 1 住まい、介護、医療および生活支援・介護予防が一体となったシステムである。
- 2 概ね 30 分以内にサービスが提供される日常生活圏域を基準とする。
- 3 地域包括支援センターは、高齢者の権利擁護の業務を担う。
- 4 地域包括支援センターの設置主体は、都道府県である。

問題 115 加齢に伴う生理機能の変化について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 生理機能の変化は不可逆的である。
- 2 肺の弾性収縮力が低下し、残気量が減少する。
- 3 尿の濃縮力が低下する。
- 4 血管の弾力性が低下し、収縮期血圧が上昇する。

問題 116 介護保険法に基づく施設について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 介護老人保健施設は、リハビリテーションを実施する。
- 2 グループホームは、認知症のある要介護者が共同生活をする住居である。
- 3 小規模多機能型居宅介護は、デイサービス、訪問看護およびショートステイを提供する。
- 4 看護小規模多機能型居宅介護は、看取りにも対応できる。

問題 117 高齢者の自立支援と介護予防について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 介護予防とは、要介護状態になることをできる限り防ぎ、要介護状態が悪化しないよう機能の維持を図ることである。
- 2 介護予防プランは都道府県が作成する。
- 3 エンパワーメントとは、対象者自身が持つ能力を最大限に引き出すことである。
- 4 ヘルスプロモーションにおいては、健康寿命の延伸が重視される。

問題 118 高齢者のための国連原則について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 自立の原則
- 2 公平の原則
- 3 参加の原則
- 4 ケアの原則

問題 119 高齢者の知的機能について、正しいものの組合せを一つ選べ。

- a 流動性知能とは、過去に得た知識や経験をもとに物事に対処する能力をいう。
- b 流動性知能は、60歳を過ぎても急激な変化はない。
- c 結晶性知能には、日常生活における理解力、判断力および一般常識に関する能力がある。
- d 結晶性知能は、60歳ごろまで上昇し、その後、緩やかに低下する。

- 1 a、b 2 a、d 3 b、c 4 c、d

問題 120 認知症高齢者とのコミュニケーションについて、正しいものを一つ選べ。

- 1 記憶障害や見当識障害に留意して関わる。
- 2 情緒面や感情の機能低下に留意して関わる。
- 3 同じ話を何度もする時は、何度も話していることに気づかせる。
- 4 こころの安定を図るには、最近の出来事を思い出しながら語るように促す。

問題 121 認知症と主な症状の組合せで、正しいものを一つ選べ。

- | | | | |
|---|----------------|---|--------|
| 1 | アルツハイマー型認知症 | — | 短期記憶障害 |
| 2 | 前頭側頭型認知症(ピック病) | — | まだら認知症 |
| 3 | レビー小体型認知症 | — | 常同行動 |
| 4 | 血管性認知症 | — | 妄想・作話 |

問題 122 高齢者の加齢に伴う姿勢と動作の変化について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 前屈姿勢、円背になりやすい。
- 2 歩行や立ち上がりの機能が低下する。
- 3 つま先と踵で地面を擦るように歩く。
- 4 機能的自立度評価法(F I M)やバーセルインデックスでは、合計点が高いほど、自立度が低い。

問題 123 高齢者の脱水とその看護について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 腎機能の低下により、糸球体濾過量が低下することで脱水になりやすい。
- 2 口渇の感受性が鈍くなり、水分補給が不足する。
- 3 水分出納のバランスをチェックする。
- 4 電解質の補給を行うために、高張液の輸液は急速に滴下する。

問題 124 高齢者の褥瘡発生リスクについて、正しいものを一つ選べ。

- 1 発赤を認めたら、褥瘡発生リスクをアセスメントする。
- 2 ブレーデンスケールを用いてアセスメントを行う。
- 3 体圧の分散は、褥瘡発生リスクを高める。
- 4 90度側臥位のポジショニングで、褥瘡の発生リスクは低くなる。

問題 125 高齢者の感染症看護について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 ノロウイルスによる感染症の場合、トイレの消毒は次亜塩素酸ナトリウムを用いる。
- 2 肺炎時、食欲が出ず食事摂取できないときは、少量で栄養摂取できるゼリーや栄養食などをすすめる。
- 3 インフルエンザの予防接種を受けている高齢者は、インフルエンザを発症することはない。
- 4 ノルウェー疥癬(角化型疥癬)は、免疫力が低下した高齢者に発症しやすい。

問題 126 高齢者の大腿骨頸部骨折とその看護について、正しいものの組合せを一つ選べ。

- a 骨粗鬆症を有する高齢者に好発する。
- b ガーデン分類のステージⅡでは、人工骨頭置換術が適応となる。
- c 人工骨頭置換術後は、股関節の脱臼の危険性があるので体位変換は禁忌である。
- d 術後は、深部静脈血栓症予防のため早期離床を図る。

- 1 a、b 2 a、d 3 b、c 4 c、d

問題 127 妊娠中の異常と看護の組合せで、正しいものを一つ選べ。

- | | | | |
|---|----------|---|--------|
| 1 | 妊娠性貧血 | — | 運動促進 |
| 2 | 切迫早産 | — | 安静 |
| 3 | 妊娠高血圧症候群 | — | 高カロリー食 |
| 4 | 前置胎盤 | — | 体重管理 |

問題 128 妊娠糖尿病が胎児に与える影響について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 1型糖尿病
- 2 巨大児
- 3 低出生体重児
- 4 出生時低血糖

問題 129 胎盤の剥離徴候について、正しいものを一つ選べ。

- 1 フリードマン曲線
- 2 産徴
- 3 ビショップスコア
- 4 アールフェルド徴候

問題 130 褥婦の看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 分娩後 12 時間時に子宮底が臍高の位置にある場合は、子宮復古不全を疑う。
- 2 産褥 10 日以降は、赤色悪露となることを説明する。
- 3 産褥 1 か月程度はシャワー浴にするように説明する。
- 4 新生児の授乳時間の目安は、1 回につき 30～40 分程度とするように説明する。

問題 131 生後 2 日目の新生児について、正常を逸脱しているものを一つ選べ。

- 1 体重が、出生時より 5%減少する。
- 2 体温は、38.0℃である。
- 3 便は、暗緑色便である。
- 4 肉眼的黄疸が出現する。

問題 132 妊娠による母体の生理的変化について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 基礎代謝は亢進する。
- 2 妊娠初期に、月経のような少量の出血がある。
- 3 妊娠初期には、つわりが出現する。
- 4 下肢の静脈瘤が生じやすい。

問題 133 乳幼児のカウプ指数の標準値について、正しいものを一つ選べ。

- 1 12 以下
- 2 13～15 未満
- 3 15～19 未満
- 4 22 以上

問題 134 胎盤を介して胎児に移行する免疫グロブリンについて、正しいものを一つ選べ。

- 1 I gA
- 2 I gG
- 3 I gM
- 4 I gE

問題 135 小児の嘔吐時の看護について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 保護者から発症前の食事内容を聞き取る。
- 2 溢乳^{いつにゅうじょう}状か噴水状か、吐き方の観察を行う。
- 3 誤嚥予防のために、頭を低くして寝かせる。
- 4 皮膚の乾燥状態を観察する。

問題 136 川崎病について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 男児より女児に多い。
- 2 原因不明の発熱が5日以上続く。
- 3 口腔粘膜が、発赤する。
- 4 合併症には、冠動脈病変がある。

問題 137 自閉スペクトラム症(自閉症スペクトラム障害)の特徴的な症状について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 他人の気持ちがわかりにくい。
- 2 いつもと異なる場面になるとパニックになる。
- 3 会話が一方的である。
- 4 注意力が散漫である。

問題 138 個室隔離状態にある学童期の白血病患児の看護について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 患児が個室から出るときは、マスクをつけるよう説明する。
- 2 治療については、本人にも説明し、理解と協力を得る。
- 3 食事は、生ものを禁じる。
- 4 学習に対する支援はしない。

問題 139 E. H. エリクソンによる幼児期の発達課題について、正しいものを一つ選べ。

- 1 信頼 対 不信
- 2 自律性 対 恥と疑惑
- 3 勤勉 対 劣等感の克服
- 4 生殖性(生産性) 対 自己停滞

問題 140 困難な状況を回避し、不安や恐怖から逃れようとする防衛機制について、正しいものを一つ選べ。

- 1 逃避
- 2 投射(投影)
- 3 昇華
- 4 合理化

問題 141 精神症状の説明について、正しいものを一つ選べ。

- 1 思考抑制とは、思考過程が停滞し、新たな思考が得られない状態である。
- 2 カタレプシーとは、無意識に同じ動作を繰り返し続ける行為である。
- 3 幻覚とは、実際に存在する感覚刺激に対し誤った知覚をすることである。
- 4 健忘とは、新しいことを記憶できなくなることである。

問題 142 精神保健指定医の診察(判断)が必要な項目について、正しいものを一つ選べ。

- 1 身体的拘束
- 2 人権擁護に関する行政職員との面会
- 3 任意入院
- 4 任意入院患者の24時間をこえない開放処遇の制限

問題 143 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に規定されている内容について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 入院形態
- 2 通信・面会
- 3 精神保健福祉センター
- 4 就労移行支援

問題 144 器質性精神障害について、正しいものを一つ選べ。

- 1 心気障害
- 2 アルツハイマー病
- 3 アルコール依存症
- 4 パニック障害

問題 145 精神科医療について、正しいものの組合せを一つ選べ。

- a わが国の精神医療は、入院中心の医療から地域生活中心の医療に転換されてきている。
- b デイケアは入院中の患者が対象となる。
- c 精神科リハビリテーションには光(刺激)療法がある。
- d 看護職は、他の専門職と連携を図りながら、患者を支援していくことが大切である。

- 1 a、b 2 a、d 3 b、c 4 c、d

問題 146 抗精神病薬の副作用とその症状の組合せで、正しいものを一つ選べ。

- | | | | |
|---|----------------|---|--------|
| 1 | パーキンソン症候群 | — | 不穏状態 |
| 2 | アカシジア | — | 便秘 |
| 3 | 抗コリン作用(自律神経異常) | — | 口渇 |
| 4 | 遅発性ジスキネジア | — | 起立性低血圧 |

問題 147 うつ病について、誤っているものを一つ選べ。

- 1 病前性格として執着気質がある。
- 2 不眠や食欲不振がみられることが多い。
- 3 症状として幻聴が出現する。
- 4 治療として認知(行動)療法が用いられることがある。

問題 148 精神症状のある患者の看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 薬物(物質)依存状態にある患者の入院初期は、集団になじめる環境整備を優先する。
- 2 重度の躁状態の患者には、時間をかけて訴えが終わるまで傾聴する。
- 3 幻覚のある患者には、気が紛れるよう騒がしい環境を作る。
- 4 多動・多弁が生じているときは、落ち着いた態度で接する。

問題 149 統合失調症患者の精神症状の悪化を示すものについて、誤っているものを一つ選べ。

- 1 手指の振戦が出現する。
- 2 食事に対して特別な考えやこだわりが強くなる。
- 3 身辺整理ができなくなる。
- 4 他者との感情交流が鈍麻になる。

問題 150 精神科入院患者の看護について、正しいものを一つ選べ。

- 1 看護職が代理行為をすることは、法律で禁止されている。
- 2 入院早期から、社会復帰に向けた職業訓練を行う。
- 3 外泊中の問題や課題は、退院に向けての指導に反映する。
- 4 家族には、入院中の患者の生活についての説明は控える。

#####